

STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY

NO. 11949

UNZER FLORE

I. Giligich

•



NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER
AMHERST, MASSACHUSETTS

NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER
AMHERST, MASSACHUSETTS
413 256-4900 | YIDDISH@BIKHER.ORG
WWW.YIDDISHBOOKCENTER.ORG



MAJOR FUNDING FOR THE
STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY
WAS PROVIDED BY:

Lloyd E. Cotsen Trust
Arie & Ida Crown Memorial
The Seymour Grubman Family
David and Barbara B. Hirschhorn Foundation
Max Palevsky
Robert Price
Righteous Persons Foundation
Leif D. Rosenblatt
Sarah and Ben Torchinsky
Harry and Jeanette Weinberg Foundation
AND MEMBERS AND FRIENDS OF THE
National Yiddish Book Center



The *goldene pave*, or golden peacock, is a traditional symbol of Yiddish creativity. The inspiration for our colophon comes from a design by the noted artist Yechiel Hadani of Jerusalem, Israel.

The National Yiddish Book Center respects the copyright and intellectual property rights in our books. To the best of our knowledge, this title is either in the public domain or it is an orphan work for which no current copyright holder can be identified.

If you hold an active copyright to this work – or if you know who does – please contact us by phone at 413-256-4900 x153, or by email at digitallibrary@bikher.org

אונזער פלאַרע

געוויקסן = באַשטימער
פון דער פוילישער ליטווישער און טיילווייז
וואַלינער, גאַליצישער און לעטלאַנדישער פלאַרע.

1 טייל

ביימער און קוסטעס

אַרויסגעגעבן דורך דער צענטראַלער יידישער שול-אַרגאַניזאַציע, ווילנע.

1 9 2 3

זעצעריי פון דער צענטראַלער יידישער שול-אַרגאַניזאַציע, ווילנע.

צו די לערער.

פאר דער לעצטער צייט פארנעמט נאטורוויסנשאפט אלץ מער און מער אַרט אין דער מאָדערנער שול. די לערער פאַרלאָזן פיסלעכווייז דעם דעמאָנטראַטיוון און גייען איבער צום אַרבעטס-מעטאָד. דאָרט וואו ס'לאָזט זיך ניט דורכפירן דעם אַרבעטס-מעטאָד אין דער גאַנצער ברייט, ווערט אַיינגעפירט פראַקטישע אַרבעט אויף נאטורוויסנשאפט, וואו די קינדער ווערן צוגעצויגן צום אַקטיווסטן אַנטייל אין די לעקציעס.

אין קיין צווייג אָבער פון נאטורוויסנשאפט איז ניט אַזוי גרינג אָנגענומען דידיאָזיקע מעטאָדן, ווי אין באַטאָניק.

פראַקטישע אַרבעט אויף דער ניט באַלעבסטער נאטור, אַנאָטאָמיע און זאָאָלאָגיע שטויסן זיך אָפּט אָן אויף גרויסע שוועריקייטן. די פאָלקס-שול פאַרמאָגט ניט די נויטיקע צאָל מכשירים און קיין צוגעפאַסטע צימערן, וווּ די אַרבעט זאָל קענען ראַציאָנאַל געפירט ווערן. פאַר באַטאָניק אָבער, פאָדערן זיך כמעט קיין מכשירים ניט. קיין באַזונדערע צוגעפאַסטע צימערן זיינען דאָ אויך ניט נויטיק. די גרינע וועלדער און ברייטע פעלדער זיינען די צוגעפאַסטסטע ערטער פאַר די לעקציעס. איין עקסקורסיע אין וואַלד, אין פעלד און אויפן גאָרטן פאַרבייטן אַיך צענדליקער קלאַסן-לעקציעס. באַזונדערס וויכטיק איז דער דאָזיקער צווייג פאַר אונזער יידישער שול. אונזערע קינדער, וועלכע זיינען געבאָרן געוואָרן און אויסגעוואַקסן אין שטאָט, ווייט פון דער נאטור, ווייסן נאָר צוויי טערמינען פאַר געוויקסן: אַ בוים און אַ גראַס. פאַר דעם גרעסטן צאָל קינדער איז אַ גרויסע איבערראַשונג, אַז גראַס בלייבט. אונזער אויפגאַבע איז לערנען די קינדער קוקן, זען און באַאָבאַכטן די נאטור. עקס-קורסיעס און אַרבעט אויף די שול-גערטנער דאַרפן ווערן דער גרונדשטיין פונם למוד באַטאָניק.

די קינדער אָבער זאָלן קענען זעלבסטשטענדיק אַרבעטן אין אויספילן די אויפגאַבן, וועלכע ווערן זיי אַרויסגעגעבן. באַזונדערס אויף סיסטעמאַטיק, מוזן זיי האָבן הילפס-ביכער. איינער פון די נויטיקסטע הילפס-ביכער פאַר די קינדער איז אַ באַשטימער פון געוויקסן. אָן אַ באַשטימער קענען זיך ניט באַגייין ניט נאָר די שילער, נאָר זייער אָפּט אויך דער לערער. ביז איצט האָט

מיט א באשטימער זיך געקענט באנוצן נאָר דער לערער, ווייל די באשטימערס זיינען געווען אָדער אויף רוסיש, אָדער אויף פויליש און דאָ האָט זיך אָנגע-
הויבן אַ סדרה טערמינאָלאָגיע. יעדער לערער פון באַטאַניק געדענקט, וואָס
פאַר אַ צרות אים איז אויסגעקומען אויסצושטיין ביים צוטראַכטן אויף אַנאָרט
די נויטיקע טערמינאָלאָגיע. און ס'פלעגט מערסטנטייל אויסקומען באַנוצן זיך
מיט אַ רוסישן אָדער פוילישן נאָמען, וואָס איז דעם קינד אַבסאָליוט פּרעמד
און זייער שווער צו געדענקען. איך האָב זיך געשטעלט פאַר אַן אויפגאַבע שאַפן
אַזאַ הילפס-בוך פאַרן לערער און פאַרן שילער. איך ווייס, אַז די אַרבעט איז
זייער אַ שווערע און ס'וועלן אָן שום ספק, באַזונדערס אין דער ערשטער
אויפלאַגע, זיין פעלערן. איך האָף אָבער, אַז מיט דער צייט ביי דער פּראַק-
טישער אָנווענדונג פונם בוך וועלן זיך די פעלערן אַרויסווייזן און באַזייטיקט
ווערן. איך וועל זיין זייער דאַנקבאַר די חברים לערער פאַר זייערע אָנוויי-
זונגען און באַמערקונגען בנוגע דעם בוך.

פּדי ניט פאַרטייערן דעם בוך און פאַרגיכערן זיין דערשיינען, האָב איך
באַשטימט צעטיילן דעם גאַנצן מאַטעריאַל און אַרויסגעבן אים אין 3 טיילן:
I=טער טייל — ביימער און קוסטעס, II=טער טייל — אינטייליקע געוויקסן,
III=טער — צווייטייליקע.

דער באַשטימער נעמט אַרום די פּלאַנע פון פוילן, ליטע, טיילווייז וואַלין,
באַליציען און לעטלאַנד.

י. גילגיש.

ווילנע, 8 יאנואר 1923.

אריינפיר=ווארט.

באַשטימען אַ געוויקס הייסט לויט זיינע סמנים געפינען, ווי הייסט דער-
דאָזיקער געוויקס. צו וועלכער משפּחה געהערט ער. פון דעם פאַרימטן באַטאַ-
ניקער לינעאוס אָן איז אָנגענומען, אַז יעדער וויסנשאַפּטלעכער נאָמען (*) פון
אַ געוויקס ווערט באַצייכנט מיט צוויי ווערטער. אין יידיש שטייט פריער דער
נאָמען פון דעם אַרט און דערנאָך פונם מין, למשל נידעריקע בעראָזע, וואו
נידעריקע באַדייט די באַצייכענונג פונם אַרט און בעראָזע פונם מין, —

(*) אַלס וויסנשאַפּטלעכער נאָמען איז אָנגענומען דער לאַטיינישער, ווייל אין אַנדערע
שפּראַכן האָבן דיזעלבליקע געוויקסן פאַרשיידענע פאַלקס-נעמען אין פאַרשיידענע ערטער.

אין לאטיין שטייט פריער דער נאָמען פונם מין און דערנאָך פונם אָרט, למשל *Betula humilis*.

אָפט טרעפט, אַז איין געוויקס האָט דאָך עטלעכע לאַטיינישע נעמען, דאָן ווערט באַנוצט דער אָנגענומענסטער. אַזוי ווי אייניקע נאַטורפּאָרשער האָבן געגעבן איין נאָמען פאַרשיידענע געוויקסן, ווערט אַלע מאָל באַצייכנט לעבן לאַטיינישן נאָמען די פאַמיליע פון דעם נאַטורפּאָרשער, וועלכער האָט פאַר דעם געוויקס אַ נאָמען צוגעטראַכט, און דער נאָמען איז אָנגענומען געוואָרן, למשל *Populus alba* L. (לינעאוס, Linnaeus).

כדי צו באַשטימען אַ געוויקס, באַנוצט מען זיך מיט אַזוי גערופענע דיכטאַטאַמישע טאַבעלן. ד. ה. אַזעלכע טאַבעלן, אין וועלכע די סמנים גייען זיך פונאַנדער אין קעגנזייטיקע ריכטונגען. פריער דאָרף מען באַשטימען די משפּחה, צו וועלכן דער געוויקס געהערט (לויט דער ערשטער טאַבעלע, זייט 1—7). ווען די משפּחה איז שוין באַשטימט, דאָן קען מען שוין באַשטימען לויטן זעל-ביקן פרינציפּ דעם מין און דערנאָך דעם אָרט (לעבן יעדער משפּחה איז אָנגע-געוויזן, אויף וועלכן זייטל זי הייבט זיך אָן).

די ערשטע צייט גיט זיך די טעכניק פון באַשטימען אַביסל שווערלעך דעם אָנפאַנגער, אָבער מיט דער צייט גייט דאָס זייער גרינג. ווען מע ווייסט די משפּחה, דאָן איז איבעריק צו באַשטימען פון אָנהייב אָן, — מע קען זען אויף וועלכן זייטל די משפּחה געפינט זיך און גלייך צוטרעטן צום באַשטימען די מינים און אָרטן.

די טעכניק פון באַשטימען קען מען גרינג פאַרשטיין לויט דעם פּאָלג-דיקן ביישפּיל: לאָמיר פרווון באַשטימען אַן עפּלבוים. מיר הייבן אָן פון דער טאַבעלע צו באַשטימען די משפּחות (זייט 1—7) דעם § 1. דאָרט איז געזאָגט: די בלעטער האָבן אַ פאַרם פון נאָדלען אָדער שופן; בלומען איינגעשלעכטלעכע א. א. וו. אַזוי ווי דער עפּלבוים האָט ניט קיין נאָדלאַרטיקע בלעטער און די איבעריקע סמנים פונם § 1 שטימען אויך ניט מיטן עפּלבוים, גייען מיר איבער צום צווייטן טייל פונם זעלביקן §, וואָס איז באַצייכנט מיט אַ טירע (—). דאָרט לייענען מיר:

בלעטער האָבן ניט קיין פאַרם פון נאָדלען; די זויעמענקאָספּן געפינען זיך אין פרוכטקניפל פונם פעסטל — 2.

אַזוי ווי די סמנים געפינען מיר ביים עפּלבוים, גייען מיר איבער צו דעם § 2, וועלכער איז אונז אָנגעוויזן. אין § 2 לייענען מיר:

IV

דאָס שטענגל האָט קלעטער=פעדימלעך.
דער עפּלבוים האָט ניט קיין קלעטער=פעדימלעך, גייען מיר איבער צום צווייטן טייל פון דעם זעלביקן § 2, וואו מיר לייענען:
געוויקסן אָן קלעטער=פעדימלעך — 3.
גייען מיר איבער צום § 3, ערשטן טייל:
די בלומען באַווייין זיך פאַר די בלעטער.
די בלומען פון אַן עפּלבוים צעלאָזן זיך נאָך די בלעטער, גייען מיר איבער צום צווייטן טייל פונם זעלביקן § 3.
די בלומען וויקלען זיך פונאַנדער צוזאַמען מיט די בלעטער אָדער שפעטער — 11.
גייען מיר איבער צום § 11, ערשטן טייל.
די בלומען האָבן אַ בעכערל און אַ קריינדל, אָדער נאָר אַ קריינדל — 12.
די בלומען פון אַן עפּלבוים האָבן אַ בעכערל און אַ קריינדל, גייען מיר איבער צום § 12, ערשטן טייל.
שטויבפּעדיס אַ סך (מער פון 12) — 13.
אין אונזערע בלומען זיינען אַ סך שטויבפּעדיס, גייען מיר איבער צום § 13:
בלעטער אַנטקעגנדיקע און א. וו.
ביים עפּלבוים זיינען די בלעטער ניט קיין אַנטקעגנדיקע, גייען מיר איבער צום צווייטן טייל פונם זעלביקן § 13.
בלט. פסדרדיקע — 14.
ביים עפּלבוים זיינען די בלעטער פסדרדיקע, גייען מיר איבער צום § 14, ערשטן טייל:
ביי יעדער געבלים פון ווייסע אָדער גרינבלעך=ווייסע בלומען געפינט זיך אַ געל=גרינע עליפטישע דעקבלאַט, וואָס איז צענויפגעוואַקסן מיטן בלומען-פיסל ביז $\frac{1}{3}$ פון איר לענג און א. וו.
ביים געבלים פונם עפּלבוים זיינען ניטאָ קיין דעקבלעטער, גייען מיר איבער צום צווייטן טייל:
דער געבלים אָן דעקבלעטלעך; שטויבפּעדיס אַ סך; פרוכט — ביי אייניקע פליישיקע, זאַפטיקע, ביי אייניקע פיינדל=פרוכט, ביי אייניקע אַ געזעמל פון אַ סך זויענפּרוכטלעך — משפּחה ראָזנבלומיקע, זייט 21.
דידאָזיקע סמנים שטימען מיט די סמנים פון אונזער געוואקס; הייסט דאָס, אַז ער געהערט צו דער משפּחה רעזנבלומיקע. אַזוי אַרום ווייסן מיר שוין.

צו וועלכער משפחה געהערט דער געוואוקס. מיר מישן אויף דאָס 21=טע זייטל
און נעמען דעם ערשטן § (אויפן זייטל 22):

די בלעטער צוויי אָדער דריי פּעדערדיקע; בלומען געבלעך=ווייטע א. א. וו.
ביים עפּלבוים זיינען די בלעטער ניט קיין געפּעדערטע, גייען מיר איבער
צום צווייטן טייל פון דעם זעלביקן § 1:

די בלעטער איינפאַכע אָדער נאָר איינמאָל געפּעדערטע — 2.
ביים עפּרבוים זיינען די בלעטער איינפאַכע, גייען מיר איבער צום
§ 2, ערשטן טייל:

דער שטאַם און די צווייגן האָבן קורצע, נאָר שאַרפע אָפט אייגנאַרטיק
פאַרביגענע שיפּן.

דער שטאַם און די צווייגן פונם עפּלבוים האָבן ניט קיין שיפּן, גייען
מיר איבער צום צווייטן טייל פונם זעלביקן § 2.

דער שטאַם און די צווייגן זיינען גלאַטע אָדער האָבן לאַנגע שטאַרקע
הילצערנע שיפּן — 4.

דער שטאַם און צווייגן פון עפּלבוים זיינען גלאַטע, גייען מיר איבער
צום § 4, ערשטן טייל:

בלומען געלע און א. וו.

די בלומען פון עפּלבוים זיינען ניט קיין געלע, גייען מיר איבער צום
צווייטן טייל פון § 4:

בלומען ווייסע אָדער ראָזע; דאָס בעכערל פון 5 בעכער=בלעטלעך — 5.
דער עפּלבוים האָט ראָזלעכע בלומען, דאָס בעכערל פון זיינע בלומען
באַשטייט פון 5 העכער=בלעטלעך, גייען מיר איבער צום § 5, ערשטן טייל:
5 פּרוכטקניפלעך זיצן אָפּן, אָדער נאָר מיטן באַזיס אַריינגעשטעלט אין
בלומען=בעט און א. וו.

די פּרוכטקניפלעך פון אַן עפּלבוים זיצן ניט אָפּן און ניט נאָר מיטן
באַזיס אַריינגעשטעלט אין בלומען=בעט, גייען מיר איבער צום צווייטן טייל
פונם זעלביקן § 5:

די פּרוכטקניפלעך זיינען באַהאַלטן אין אַ שטאַרק אַריינגעבויענע בלו-
מען=בעט אָדער דאָס פּרוכטקניפל אונטערשטעליק; די פּרוכט אַ זאַפטיקע,
פליישיקע, זעלטן נוסאַרטיקע — 6.

די סמנים פאַלן צוזאַמען מיט די סמנים פון אונזער געוואוקס, גייען מיר
איבער צום § 6:

בלעטער געלאָפּעטע אָדער קאָמפּליצירטע.
 די בלעטער פון אַן עפּלבוים זיינען נישט געלאָפּעט און נישט קאָמפּליצירט,
 גייען מיר איבער צום צווייטן טייל פונם זעלביקן § 6:
 בלעטער גאַנצע — 8.
 אזוי ווי ביי אַן עפּלבוים זיינען די בלעטער גאַנצע, גייען מיר איבער
 צום § 8:
 דאָס פעסטל מיט איין גריפל און א. וו.
 אזוי ווי אין אונזער בלום איז מער ווי איין גריפל, גייען מיר איבער
 צום צווייטן טייל פון דעם זעלביקן § 8:
 אַ אונטערשטעליק פּרוכטקניפל; גריפלעך 2—5, פּרוכט פליישיקע אָדער
 מעליקע — 9.
 ביים עפּלבוים זיינען 5 גריפלעך, גייען מיר איבער צום § 9:
 די פּרוכטקניפלעך צווישן זיך נישט צענויפגעוואַקסן און א. וו.
 ביי אונזער בלום זיינען די פּרוכטקניפלעך צענויפגעוואַקסן, גייען מיר
 איבער צום צווייטן טייל פון § 9:
 די פּרוכטקניפלעך צענויפגעוואַקסן — עפל, בערנעס Pirus.
 אזוי אַרום האָבן מיר שוין געפונען דעם מין. איצט זוכן מיר אויף דאָס
 קעפל: עפל, בערנעס Pirus (זייטל 25) און טרעטן צו באַשטימען דעם אָרט.
 אין ערשטן טייל לייענען מיר:
 בלעטער פעדערדיק צוואַמענגעזעצטע און א. וו.
 ביי אַן עפּלבוים זיינען די בלעטער איינפאַכע, גייען מיר איבער צום
 צווייטן טייל:
 — בלעטער איינפאַכע; 5 גריפלעך ביים באַזיס אָדער ביז העלפט צענויפ-
 געוואַקסן צווישן זיך; בלומען ראָזלעכע; שטויבזעקלעך געלע — עפּלבוים Pirus
 malus L.
 צום ערשטן מאל איז גוט צו באַשטימען אַזאָ געוואַקס, וואָס איז באַוואוסט.
 פּדי זיך צוועוויינען צו דער טעכניק פון באַשטימען.
 באַמערקונג: דער באַשטימענדיקער דאָרף זיין באַקאַנט מיט די
 איינפאַכסטע טערמינען פון באַטאַניק.

וויכטיקסטע פארקירצונגען:

בלום, בלומען.	— — —	בל.מ.
בלאט, בלעטער.	— — —	בל.ט.
בייבלאט, בייבלעטער.	— — —	בייבל.ט.
דעקבלאט, דעקבלעטער.	— — —	דעקבל.ט.
בעכערבלעטל, בעכערבלעטלעך.	— — —	בעכערבל.ט.
קריינדל.	— — —	קר.
שטויבפאָדן, שטויבפערדן.	— — —	שט.פ.
פּרוכט.	— — —	פר.
פּרוכטקניפל, פּרוכטקניפלעך.	— — —	פּרוכטקנ.
איינגעשלעכטלעכע.	— — —	איינגעשל.
צווייגעשלעכטלעכע.	— — —	צווייגעשל.
געווקס, געוויקסן.	— — —	געווק.
ערשטע העלפט.	— — —	$\frac{1}{2}$
צווייטע העלפט.	— — —	$\frac{2}{2}$
פיגור.	— — —	פיג.

מיט רוימישע ציפער ווערן באצייכנט די מאָנאַטן, ווען די געוויקסן בליען.

טאבעלע צו באשטימען די משפחות און אין אייניקע פאלן אויף מינים.

1. די בלט. (*) האָבן אַ פאָרם פון נאָדלען אָדער שופן; בלם. איינגעשלעכט-
לעכע, איינשטוביקע אָדער צוויי־שטוביקע; די זוימענקנאָספן זיצן ניט אין
פרוכטקניפלעך, נאָר אין די פאָכוועס פון באַזונדערע דעק־שופן; די
דעק־שופן ווערן שפעטער פאָרהאַרטעוועט און בילדן אַ צאַפן, אָדער
ווערן זאַפטיק, פליישיק און בילדן אַ יאָגדע. זוימען־נאָקעטע געווי. —
משפּחה נאָדל־ביימער. Coniferae זייט 8.
- בלט. האָבן ניט קיין פאָרם פון נאָדלען; די זוימענקנאָספן געפינען זיך
אין פרוכטקניפל פונם פעסטל — 2.
2. דאָס שטג. האָט קלעטער־פעדימלעך, מיט וועלכע ס'פעסטיקט זיך צו צו
די אַרומיקע געגנשטאַנדן; בליטן 5; שטפ. 5. —
ווילדע וויינטרויבן. Vitis זייט 33.
- געוויקסן אָן קלעטערפעדימלעך — 3.
3. די בלם. באַווייזן זיך פאָר די בלט. — 4.
- די בלם. וויקלען זיך פונאַנדער צוזאַמען מיט די בלט. אָדער שפעטער
(אַמאָל אַ סך שפעטער) — 11.
4. בלם. — איינגעשלעכטלעכע; מענער בלם. אין פרענזלעך (אַמאָל פרויען־
בלם. אויך אין פרענזלעך); דאָס קר. ניט אַנטוויקלט אָדער בעכער־
אַרטיק — 5.
- די בלם. בילדן ניט קיין פרענזלעך — 7.
5. די מענער און פרויען בלם. אין פרענזלעך, צוויי־שטוביקע; מענער בלם.
פון 2—24 שטפ.; פרויען בלם. מיט 1 פעסטל. — הושענא־בוים *Salix*
און אַספּע, טאַפּאַל *Populus* —
פון דער משפּחה הושענא־ביימערדיקע, Salicaceae זייט 9.
- בלם. איינשטוביקע — 6.
6. מענער בלם. אין לאַנגע אַראָפהענגענדיקע פרענזלעך; פרויען בלם. אין

גלייכע זאנגעלעך, אַרומגעוויקלטע מיט די פאַרוואַקסענע דעקבלעטלעך — לעך — מין רעמב *Quercus* —

פון דער משפּחה בוקענע, *Fagaceae* זייט 18.

— מענער בלם. אין געדיכטע צילינדרישע פרענזלעך, וואָס זיצן אין די פאַכעס פון שופן; שטפ. געצווייטלטע; דאָס פעסטל מיט 2 פאַדמאַרטיקע רויטע מיילכלעך. נוסן-ביימער *Corylus* און אַלכע *Alnus* —

פון דער משפּחה בעראָנדיקע, *Betulaceae* זייט 17.

7 (4). די בלם. האָבן ניט קיין קר. און קיין בעכ. צווייגעשלעכטלעכע און איינגעשלעכטלעכע, געפינען זיך אין זייטיקע און שפיציקע בינטלעך. צווייגעשלעכטלעכע בלם. מיט 1 פעסטל און 2 שטפ. — קלאָרבוים (יאַסען) *Fraxinus* —

פון דער משפּחה איילבערטנדיקע, *Oleaceae* זייט 36.

— די בלם. האָבן אַ בעכ. אָדער אַ קר. אָדער ביידע צוזאַמען — 8. אַ גרין בעכעראַרטיק קר. אויפן מערסטנטייל רויטלעך, אַ 4, 5, 6, 8 געטיילטער; שטפ. אַזויפיל, וויפל טיילן אין קר.; 1 פעסטל מיט אַ צוויי-געטיילט זיילכל; די בלם. אין בינטלעך ביי די זייטן פון די צווייגן; בלט. — ניט סימערטישע; די פרוכט — אַ לענגלעכע קיילעכדיקע פליגל-פרוכט.

משפּחה אולמענדיקע, *Ulmaceae* זייט 19.

— די בלם. מיט אַ בעכ. און קר. אָדער מיט אַ באַפאַרפט קר. — 9. שטפ. אַ סך, וואָס זיצן אויפן ראַנד פון אַ גלעקלאָרטיקער בלומענבעט; 1 פעסטל, זיצט אויפן דעק פון בלומענבעט — קאַרשן-בוים *Prunus* —

פון דער משפּחה ראָזנבלומיקע, *Rosaceae* זייט 21.

— שטפ. ווייניקער פון פופצן — 10. בלם. געלבלעך-גריןע אָדער ווייסלעכע, רעגלמעסיקע, צווייגעשלעכטלעכע און איינגעשלעכטלעכע אויף דעם זעלביקן געווי. דאָס בעכ. 5 געטיילט; דאָס קר. — אַ 5 בליטנדיקס; שטפ. 5—12 (מערסטנטייל 8); 1 פעסטל — געזערבוים, קליאַן *Acer* —

פון דער משפּחה קליאַנענדיקע, *Sapindaceae* זייט 32.

— בלמ. מיט א ראָזן 4 געטיילטן קר., זייער שמעקעדיקע, צווייגעשלעכט-
לעכע, זיצן צו 3 ביי די זייטן פון די צווייגעלעך; שטפ. — 8; 1 פעסטל.
מין יאָגדעלע *Daphne* —

פון דער משפּחה יאָגעדיקע, *Thymelaeaceae* זייט 34.

11 (3). די בלמ. האָבן אַ בעכ. און קר. אָדער נאָר אַ קר. — 12.
— די בלמ. האָבן אַ בעכעראַרטיקע בלומענהילע אָדער גאָר קיין בלומענ-
הילע ניט — 28.

12. שטפ. אַ סך (מער פון 12) — 13.

— שטפ. ניט מער פון 12 — 15.

13. בלט. אַנטקעגנדיקע; אַ אונטערשטעליק פּרוכטקניפל פון 4, 5 נעסטן;
זיילכלעך ביים פעסטל 4—5, ביים באַזיס מערסטנטייל פאַרוואַקסן;
שטפ. 16 און מער; דאָס קר. פון 4—5 בליטן; דאָס בעכ. 4—5 געטיילט.
אַ קוסט מיט ווייסע שמעקעדיקע בלמ. ושאַסמין, יאָסמין *Philadelphus*
פון דער משפּחה שטיינברעכערדיקע, *Saxifragaceae* זייט 20.

— בלט. כסדרדיקע — 14;

14. ביי יעדער געבליים (האַלבשירעמל) פון ווייסע אָדער גרינבלעך-ווייסע
בלמ. געפינט זיך אַ געל-גרינע עליפטישע דעק-בלאַט, וואָס איז צענויפ-
געוואַקסן מיטן בלומען-פיסל ביז $\frac{1}{3}$ פון איר לענג; דאָס בעכ. פון
5 בעכערבלט; דאָס קר. פון 5 בליטן; שטפ. אַ סך; 1 פעסטל; די ניט
סימעטרישע שטיל-בלט. זיינען זעגאַרטיק געציינדלט — ביימער —

משפּחה לינדנדיקע, *Tiliaceae* זייט 33.

— דער געבליים אָן אַ דעקבלט. שטפ. — אַ סך; פּרוכט — ביי אייניקע פליי-
שיקע, זאַפטיקע, ביי אייניקע ביינדל-פּרוכט, ביי אייניקע אַ געזעמל פון
אַ סך זוימענפּרוכטלעך. —

ראָזנבלומיקע, *Rosaceae* זייט 21.

15 (12). דאָס פּרוכטקניפל אַ אויבערשטעליקס — 16.

— דאָס פּרוכטקניפל — אַ אונטערשטעליקס — 24.

16. בלמ. — אומרעגלמעסיקע — 17.

— בלמ. רעגלמעסיקע — 18.

17. אַ זומערפייגלאַרטיק קר., ד. ה. ס'באַשטייט פון אַ פּאָן, צוויי פליגל און אַ שיפעלע פון 2 בליטן; שטפ. — 10; זיי זיינען אָדער אלע צוואַ מענגעוואַקסן מיט די פעדים אָדער 9 צוואַמענגעוואַקסן אין 1 פריי; איין פעסטל; פּרוכט — אַ שויט. —

זומערפייגלאַרטיקע, Papilionaceae זייט 30.

— בלמ. רעגלמעסיקע — 18.

18 (16, 17). בלמ. אָן אַ בעכ., מיט אַ קר. 2—4 געטיילט, ביים באַזיס רער אַרטיק; שטפ. — 8 (דאָן זיינען די בלמ. ראָזע שמעקעדיקע), אָדער 4 (דערביי זיינען די בלט. ווי באַזילפערט) בלט. אָן ביי בלט. — 19

— די בלמ. מיט אַ בעכ. און קר.; דאָס בעכ. איז אַמאָל באַפאַרבט — 20
19. בלמ. ראָזע, שמעקעדיקע, בליען איידער ס'צעלאָן זיך די בלעטער, זיצן צו 3 ביי די זייטן פון די צווייגלעך; דאָס קר. מיט אַ 4 געטיילטן אָפּבויג, לייקעאַרטיק; שטפ. — 8; די פּרוכט — אַ רויטע (זעלטן געלע) יאַגדע

יאַגדעדיקע, Thymeleaceae זייט 34.

— בלמ. אינווייניק געלע אָדער ברוינלעכע. דאָס קר. 2—4 געטיילט; שטפ. 4; די פּרוכט — אַ יאַגדע; די בלט. און יונגע צווייגן באַזילפערטע (באַדעקט מיט ווייסע און געלע שופעלעך). ווערט קולטיווירט אין די גערטנער —

משפּחה גן=עדן=ביימערדיקע, Elaeagnaceae זייט 34.

20 (18). בלמ. געלבפלעך=גרינע אָדער ווייסלעכע, רעגלמעסיקע, צווייגעשלעכטל. און איינגעשלעכטל. אויפן זעלביקן געוו.; שטפ. 5—12, מערסטנטייל 8; דאָס פעסטל מיט 2 מיילכלעך פאַרדרייטע אויף אויסן; די פּרוכט — אַ פליגל-פּרוכט (נעזער); בלט. אַנטקעגנדיקע, האַנטפאַרמיקע, 3 געלאַפּעטע אָדער גאַנצע, באַווייזן זיך מערסטנטייל נאָך די בלמ. אָדער צוואַמען מיט זיי —

קליאַנענדיקע, Sapindaceae זייט 32.

— בלמ. האַבן אַנאַנדער געבוי און באַווייזן זיך שפעטער פון די בלט. — 21
21. שטפ. 2 מאָל אַזוי פיל, וויפל טיילן פון קר., ד. ה. 8 אָדער 10; דאָס בעכ. 4—5 געטיילט; דאָס קר. פון 4—5 בליטן אָדער 4—5 געטיילט; בלמ. אין הענגלעך אָדער אין קעפלעך; פּרוכט אַ שאַכטעלע אָדער

א יאגדע, אָדער אַ ביינדל-פּרוכט. אַ קוסט מיט גאַנצע מערסטנטייל לעדער-
אַרטיקע בלט. —

משפחה סטעפנדיקע, *Ericaceae* זייט 35.

— שטפ. אַזוי פיל, וויפל בליטן — 22
22. דאָס בעכ. פון 6 בלט. אין צוויי רייען צו 3 בלט; דאָס קר. פון
6 בליטן, אויך אין 2 רייען; שטפ. — 6 אַנטקעגן די בליטן; בלמ. געלע
אין אַראָפהענגענדיקע הענגלעך; פרוכט — 2 קערנדיקע רויטע יאָגדע.
אַ שטעכעדיקער קוסט מיט גאַנצע בלט. —

משפחה באַרבאַריסנדיקע, *Berberideae* זייט 37.

— דאָס בעכ. 4—5 געטיילט; דאָס קר. פון 4, 5 בליטן; שטפ., אַזוי פיל
וויפל בליטן — 23.
23. בלמ. צווייגעשלעכטל. אָדער איינגעשלעכטל. צווייטופיקע; דאָס זיילכל
4, 2 געטיילט; בלמ. גרינע אין פאַכוועס פון די בלט; פרוכט — אַ שוואַרצע
יאָגדע מיט 2—4 ביינדלעך —

משפחה פוילביימערדיקע, *Rhamnaceae* זייט 33.

— בלמ. קליינע, ברוינע אָדער גרינבלעך-ווייסע אין פאַכוועדיקע הענגלעך
אָדער קליינע בעזימלעך; בלט. אַנטקעגנדיקע, גאַנצע, קליינגעציינדלטע;
פרוכט — אַ שאַכטעלע מיט יאָגדעאַרטיקע זוימען —

משפחה שפינדלביימערדיקע, *Celastraceae* זייט 31.

24 (15). בלט. — אַנטקעגנדיקע — 25.
— בלט. כסדרדיקע — 27.
25. דאָס קר. פון 4 בליטן; דאָס בעכ. 4 געציינדלט; שטפ. — 4; די ביינדל-
פרוכט מיט 2 ביינדלעך; בלמ. קליינע, ווייסע; בלט. גאַנצראַנדיקע —

משפחה האַרפרענטנדיקע, *Cornaceae* זייט 35.

— דאָס קר. איז אַ פאַרוואַקסנבליטנדיקס (יעדנפאַלס ביים באַזיס) — 26.
26. שטפ. 2; דאָס בעכ. 4 געציינדלט; דאָס קר. מיט אַ לאַנג רערל און 4
געטיילטן אָפּבויג; בלמ. שמעקעדיקע, ווייסע אָדער ליליע; בלט. האַרצ-
פאָרמיק-אייאַרטיקע גאַנצראַנדיקע — מאַי, בעז *Syringa* —

פון דער משפחה איילבערטנדיקע, *Oleaceae* זייט 36.

— בלט. עליפטישע אָדער לענגלעך=עליפטישע; בלם. ווייסע; דאָס קר. מיט אַ קורץ טרייבל; פרוכט—א שוואַרצע יאָגדע — ליגוסטער *Ligustrum*—

פון דער משפּחה איילבערטנדיקע, *Oleaceae* זייט 36.

— שטפ. — 5, זעלטן 4, וואָס שטעקן אַרויס פונם קר.; דאָס בעכ. 5 גע= טיילט אָדער געצינדלט; דאָס קר. 5 געטיילט, רעגלמעסיק אָדער אומ= רעגלמעסיק (כמעט 2 ליפיק) —

משפּחה ציגנבלעטערדיקע, *Caprifoliaceae* זייט 36.

27. (24) שטפ. 8 אָדער 10, ד. ה. 2 מאָל מער פאַר די טיילן פון פאַרוואַק= סענעם קר.; דאָס בעכ. 4, 5 געצינדלט; דאָס קר. 4—5 געצינדלט אָדער געטיילט; נידעריקע קוסטעלעך מיט גאַנצע לעדעראַרטיקע בלט., וואָס פאַלן מערסטנטייל ניט אַראָפּ אויף ווינטער. — ברוסניצעס *Vaccinium*

פון דער משפּחה סטעפנדיקע, *Ericaceae* זייט 35.

— שטפ. אַוויפיל, וויפל טיילן פונם פרייען קר.; בליטן 4—5; דאָס בעכ. 4—5 געצינדלט אָדער געטיילט; פרוכט אַ יאָגדע, וואָס האָט אויבן די בלט. פון דעם פאַרטרוקנטן בעכ.; בלם. אין פאַכוועדיקע הענגלעך; בלט. איינפאַכע האַנטפאַרטיקע אָן בייבלט.; קוסטעס אָפט באַדעקטע מיט שיפן, נאָדלאַרטיקע שטעכלקעס. — אַגרעם, וויינפערלעך *Ribes* —

פון דער משפּחה שטיינברעכערדיקע, *Saxifragaceae* זייט 20.

28. (11) בלט. אומפאַריק=פעדערדיק=צוואַמענגעזעצטע; בלם. אָן אַ בלומענהילע, אייגעשלעכטלעכע און צוויגעשלעכטלעכע — קלאַרבויס *Fraxinus* —

פון דער משפּחה איילבערטנדיקע, *Oleaceae* זייט 36.

— בלט. איינפאַכע; בלם. אייגעשלעכטלעכע — 29.

29. בלם. — צווייטופיקע; די מענער און פרויען=בלם. זיצן אין פרענולעך; די פרענולעך באַשטייען פון אַ גרויסער צאָל שופן (דעק בלט.), ביי וועלכע אין פאַכווע זיצט אַ בלום; מענער בלם. פון 2—24 שטפ.; פרויען=בלם. — פון 1 פעסטל מיט אַ געצווייטלט מיילכל (אַמאָל איז דאָס זיילכל זייער אַ קליינס, אָדער אינגאַנצן אומבאַמערקט, דאָן זיינען די מיילכלעך זיציקע).

ביימער אָדער קוסטעס, וועלכע בליען איידער ס'צעלאָון זיך די בלם.
אָדער צוזאַמען מיט זיי —

משפּחה הושענא-ביימערדיקע, Salicaceae זייט 9.

— בלם. איינשטוביקע; דאָס מיילכל — אַ גאַנצעס — 30.
די מענער-בלם. אין שיטערע פאַכוועדיקע, דינע, אַראָפהענגענדיקע
פרענזלעך, געזאַמלטע אין בינטלעך; שט. 5—10; די פרויען-בלם. אין
שיטערע איבערגעריסענע זאַנגען; יעדע בלם. איז באַדעקט מיט אַ וויקעלע,
וואָס ווערט פאַרהאַרטעוועט און בילדעט שפעטער אַ האַרטע הילצערנע
שיסעלע; די פרוכט אַ חזיר-נוס; די בלם. פסדרדיקע, פעדעריק געלאָפּעטע —

משפּחה בוקענע, Fagaceae זייט 18.

— די מענער בלם. אין געדיכטע צילינדרישע פרענזלעך, וועלכע זיצן אין
פאַכוועס פון שופן; שטפ. — געצווייטלטע (אַמאָל נאָר די שטויבזעקלעך
און אַמאָל אויך די פעדים); אין די פרויען געבלימען צו 2—3 פעסטלעך
אין פאַכווע פון שופּעלעך; דאָס פעסטל מיט פאַדימאַרטיקע רויטע זייל-
כלעך; בלם. מער אָדער ווייניקער געציינדלטע —

משפּחה בעראָזעדיקע, Betulaceae זייט 17.

טאבעלע צו באשטימען די מינים און ארטן.

נאקעט-זוימענדיקע.

משפחה נאָדל-ביימער, Coniferae

1. בלט. לאַנגע, שמאַל-לינעאַלע אָדער אַלאַרטיקע, אָפּשטייענדיקע — 2.
- בלט., יעדנפאלס אויף די יונגע צווייגן, שופנאַרטיקע און צוגעדריקטע — 7.
2. בלט. (אומעטום אָדער נאָר אויף די אַלטע צווייגן) זיצן בינטלעכווייז, אַרומגערינגלט ביים באַזיס מיט אַ הייטלדיק שיידל (בלמ. איינשטוביקע) — 3.
- אַלע בלט. איינציקע — 4.
3. בלט. צו 2—5 אין אַ בינטל פאַלן ניט אָפּ אויף ווינטער — סאַסנע *Pinus*
- פילנאָדלדיקע בינטלעך, וואָס פאַלן אָפּ אויף ווינטער — לאַריקס *Larix*
- 4 (2). בלט. פסדרדיקע אָדער זיצן אין 2 רייען — 5.
- די בלט. זיצן אין קרייזן צו 3 (די בלמ. 2-שטוביקע, פרוכט-אַ יאַגדע) —
- נאָדל-יאַגדע *Juniperus*
5. פרוכט — אַ צאַפן (מיט דינע שופן); בלמ. איינשטוביקע — 6.
- פרוכט — אַ רויטע יאַגדע; בלמ. צוויי-שטוביקע — *Taxus*
6. בלט. פלאַכע, 2 ריאיאקע, אויפן שפיץ געוויינטלעך געקאַרבטע; די צאַפנס צעשיטן זיך אויף באַזונדערע שופן — פייכמע *Abies*
- בלט. 4 קאַנטטיקע, שאַרפע. דער לאַנגער צאַפן הענגט אויף אַראָפּ —
- מענענבוים, יאַדלע *Picea*
- 7 (1). בלט. שאַרפע. פרוכט — אַ פלוילעכע יאַגדע — *Juniperus*
- בלמ. איינשטוביקע; פרוכט — קליינע צאַפנס, פון אַנטקעגנדיקע לענגלעכע שופן; בלט. שופיקע — מוע, לעבנסבוים *Thuja*


געוויינטלעכער מאַקסום *Taxus baccata* L.

אַ קוסט אָדער אַ ביימל. ליטע, לעטלאַנד, פוילן. III—IV.

לאַריקס *Larix* — אַ בוים.

קורצע נאָדלען (פון 1—3 סמ. די לענג) מיט שמאַלע שופן אויף די קליינע צאַפנס — אייראַפּעאישער לאַריקס *L. decidua* Mill. (פיג. 1)

נאָדלען — לענגערע (3—5 סמ. די לענג); גרעסערע צאָפנס מיט האַריקע קיילעכדיקע שופן. — סיבירישער אָדער פוילישער לאַריקס *L. Sibirica* DC.



סאָסנע *Pinus* L.

אַ בוימ. בלט. צו 2 אין אַ בינטל; די קאָרע רויטלעך ברוין; די צייטיקע צאָפנס — טונקעלע — געוויינטלעכע סאָסנע *Pinus silvestris* L. אין גאַנץ פוילן און אַרומיקע געגנטן. V, VI (פיג. 2). צו 5 בלט. אין אַ בינטל — די אַמערקאַנער *P. strobus* L. (וויימוט ס.) V, VI.

פיג. 1.

איראָפעאישער לאַריקס *Larix decidua* — מענלעכע בלמ; ₂ — ווייבלעכע. (a) אויס-געוואַקסענע אַקס פונם צאָפן, (b) נאָדלען, (c) דער צאָפן, אונטער אים — וויימען.

מענענבויים (נאָדלע),

Picea Linc. — אַ בוימ.

אומעטום אין אונזערע קאָנטן V. (פיג. 3)

נאָדלבוים, פֿיכמע *Abies* Dc. — אַ בוימ.

די בלט. — אַרום 2—5 סמ. די לענג. אונטן מיט 2 ווייסע פאַסקעס; די צאָפנס 12—15 סמ. די לענג — איראָפעאישע פ. *A. alba* Mill. — קר. פוילן, גראָדנער און וואָלינער גוב. V. (פיג. 4).

נאָדל-יאַגרע, *Juniperus* L. — אַ קוסט.


אַ גלייכער שטאַם; די בלט. שטאַרק אָפגערוקט פונם שטאַם — געוויינטלעכע נאָדל-יאַגרע *J. communis* L. אין נאָדל וועלדער V, VI (פיג. 5).

משפחה הושענא-ביימערדיקע Salicaceae


1. די דעקבלט. (שופל.) ביי די בלם. זיינען גאנצראנדיקע; אָנשטאָט אַ בלומענ-
הילע 1—2 האָניק דריזן, שטפ. 2—5, זעלטן מער — הושענא בויס *Salix* —
דעקבלט. פרענוזארטיק איינגעשניטענע אָדער געצינדלטע; אַ שיסלאַרטיקע
בלומענהילע; שטפ. 8—30. — אַספּע, טאַפּאַל — הילמבויס *Populus*.

הושענאבויס *Salix* L.

דאָס באַשטימען די אַרטן פון
הושענאביימער איז זייער שווער,
ווייל ס'זיינען דאָ אַסך געמישטע
אַרטן. כדי פינקטלעך צו באַשטי-
מען די דאָזיקע אַרטן, מוז מען
האַבן מאַטעריאַל פון די מענלעכע
און ווייבלעכע געוויקטן: (1) מיט
בליענדיקע פרענזלעך און (2) מיט
פולקאָם אַנטוויקלטע בלט. אין
דער טאַפּעלע ווערן געגעבן נאָר
גרונד-פאַרמען.



1. דעקבלט. העלע, געלפלעך-גרינע;
די מענלעכע בלם. מיט 2—12
פרייע שטפ.; די שטויבזעקלעך-
געלע; די בלט. מיט זייער דינע
זייטיקע אָדערלעך. די פרענזלעך
צעלאָזן זיך צוזאַמען מיט די
בלט. — 2.



פיג. 2.

סאַסנע *Pinus silvestris*
(a) אַ צווייגל מיט מענלעכע בלם.
(b) אַ צווייגל מיט ווייבלעכע בלם.
(c, d) דער צאָפּן פון אַ סאַסנע,
(e) נאָדלעך, (f) ווינטן.


- די דעקבלט. זיינען אַנדערש באַ-
פאַרבט — 6.

2. שטפ. 2 אָדער 4 און מערער; די דעקבלט. פאַלן אַראָפּ איידער ס'ווערט
צייטיק די פרוכט — 3.
— שטפ. 3; די דעקבלט. בלייבן ביז ס'ווערט פאַרטיק די פרוכט; בלט-
גלאַטע, אויבן בלאַנקנדיקע, לענגלעכע אָדער לאַנצעט-פאַרמיקע, שאַרפע;

די דעקבלט. האלב הארצפארמיקע, גאנץ היפשע, א בימל אָדער א קוסט.
(פיג. 6. 1) דריי שטויבפע דימדיקער ה. *S. triandra L.* ביי
די ברעגן. אומעטום IV—V.

3. די צייטיקע בלט. הוילע, אויבן בלאנקענדיקע (ביים צעלאָן קלעפיקע און
אָפטמאַל האָריקע); די ווייבלעכע בלמ. מיט 2 דריין (פאָדערשטע און
הינטערשטע) — 4.

די בלט. אפילו די צייטיקע זיינען אונטן מער אָדער ווייניקער האָריקע אויבן



פיג. 3.

טענענבוים (אָדלט) *Picea vulgaris*
(a) א צווייגל מיט מענלעכע בלמ. (b) דער
שפיץ פון א צווייגל מיט א ווייבלעכער בלמ;
איבער איר זוימען מיט און אן פליגעלעך;
(c) א צייטיקער צאפן; (d) א שופ פון צאפן
פון אינזייניק און דרויסן; (e) נאָדלטן.

לאַר בערדיקער ה. *S. pentandra L.* אין פייכטע ערטער, ביי
ברעגן. אומעטום. IV—VI.

5. די דעקבלט. מיט לאַנגע גלייכע הערעלעך. די בייבלט. האַלבהאַרצפאָר-
מיקע, פרי אָפּפאַלנדיקע; בלט. ברייטלאַנצעטפארמיקע. א בויס (פיג. 6. 5).

מאַטע (ביים צעלאָן זיינען
ביידע זייטן פון די בלט. זיל-
בער-האַריקע). ווייבלעכע בלמ.
מיט 1 דריין (הינטערשטער);
שטפ. — 2; פעסטלעך כמעט
זיצנדיקע. א בויס (פיג. 6. 2)
זיל בערנער ה. *S. Alba L.*
אין פייכטע ערטער, ביי וועגן,
אויף ברעגן, אומעטום אין אונ-
זער געגנט. IV—V.

4. שטפ. — 2; בלט. לאַנצעטפאָר-
מיקע; זייער לענג איז לערך
4 מאָל גרעסער פאַר דער
ברייט — 5.

שטפ. 4—5; די בלט. אייפאָר-
מיקע-עליפטטישע; זייער לענג איז
2—2½ מאָל לענגער פאַר דער
ברייט; די בלאַט-שטילכלעך
מיט בראָדעווקעלעך; די קאָרע
רויט אָדער ברוין. א קוסט
אָדער א בויס (פיג. 6. 3, 4)


לאַר בערדיקער ה. *S. pentandra L.* אין פייכטע ערטער, ביי
ברעגן. אומעטום. IV—VI.

די דעקבלט. מיט לאַנגע גלייכע הערעלעך. די בייבלט. האַלבהאַרצפאָר-
מיקע, פרי אָפּפאַלנדיקע; בלט. ברייטלאַנצעטפארמיקע. א בויס (פיג. 6. 5).

ברוכיקער ה. *S. fragilis* L. אין פייכטע ערטער און ביי ברעגן, אומעטום.


די דעקבלט. ביז העלפט קורץ-האַריקע; די בייבלט. לאַנצעט-אַלאַרטיקע; בלט. שמאַלע אָדער לינעאַל-לאַנצעטפאָרמיקע; אַ בוים מיט לאַנגע אַראָפּ-הענגענדיקע צווייגן (פיג. 6. 6). ווייניג ענדיקער ה. *S. babylonica* L. ווערט קולטיווירט נאָר אין דרום פוילן, גאַליציען. IV—V.

6. (1) די שטפ. צענויפגעוואַקסענע, ביים באַזיס האַריקע; בלט. אָן בייבלט ביים צעלאָזן באַדעקטע מיט געבלעכע הערעלעך, שפעטער אינגאַנצן הוילע, אונטן בלוילעכע; די צווייגן פורפורנע אָדער



פיג. 5.

נאָדל-יאגדע *Juniperus communis* (a) אַ פרענזל, (b) אַ מענלעך פרענזל און דריי שופן מיט שטפ., (c) אַ ווייב-לעך פרענזל, (d) אַ דורכשניט פון פרוכט, (e) אַ נאָדל און איר קווערשניט.



פיג. 4.

איראָפּעאישע פֿיכטע *Abies alba* (a) אַ צווייגל מיט 2 צאָפּנס, דער רעכטער צעשיט זיך אויף באַ-זונדערע שופן (b) אַ שופּ פון אויבן, (c) דער זעלבער שופּ פון אינזייניק.


געלע, בלאַנקנדיקע. — אַ קוסט $1\frac{1}{2}$ —3 מ. די הייך (פיג. 7. 7, 8) פורפורנער ה. *S. purpurea* L. ביי ברעגן. כמעט אומעטום.

שטפ. פרייע — 7.

7. די צווייגן בלוילעכע, דער בלויער אָנהויך ווערט גרינג אַראָפּגעווישט; די פרענזלעך גראָפּע; דעקבלט. טונקעלע, לאַנג-האַריקע, שטויבזעקל. געלע.

א בויס אָדער אַ קוסט. (פיג. 7. 1) ש י מ ל, ק ע ר ה. *S. daphnoides* Vill.
אויף די ברעגן פון טייכן און אָזערעס, אין ווילדן צושטאַנד און קול-
טיווירטע, אובעטום III—IV.

די צווייגן אָן אַ בלוילעכן שימל — 8
דאָס פרוכטקניפל הויל; שטפ. ביים באַזיס האַריקע; בלט. גרויסע, גע- 8



פיג. 6.

בלומען פון הושענא-ביימער.
(1 דרייטויבפערדימיקער ה.; 2 זילבערנער ה.; 4 לאַרבער-
דיקער ה.; 5 ברוכיקער ה.; 6 וויינענדיקער ה.)


ציינדלטע (ביים טריקענען ווערן שוואַרץ). אַ קוסט $2\frac{1}{2}$ —2 מ. די הויך
(פיג. 7. 6) שוואַרצווערנדיקער ה. *S. nigricans* Sm. אויף
פייכטע לאַנקעס און זומפן IV—V.

דאָס פרוכטקניפל באַדעקט מיט הערעלעך — 9
דאָס זיילכל-פאָדימאַרטיק, די זעלביקע לענג ווי די טיילן פון מיילכל
אָדער לענגער — 10.

דאָס זיילכל קירצער פאַר די טיילן פון מיילכל — 11
די פרענזלעך—ווייסע אַדאַנק די געדיכטע הערעלעך; די יונגע פּרילינגס-
בלט. זיינען פון ביידע זייטן ווייסהאַריקע; די רייפֿע בלט. זיינען אויפן
גערונצלט, מיט אַ ווייסן פוך, פון אונטן מיט טונקעלע הערעלעך, לאַנג-
עליפטישע כמעט גאַנצראַנדיקע; די פעסטלעך—ווייסהאַריקע. — אַ גידע-
ריקער קוסט 30—60 טמ. די הייך. (פיג. 8. 1) — לאַפלאַנדי-
שער ה. *S. lapponum* L. אין טאַרף-זומפן. IV—V.

די פרענזלעך גיט קיין ווייסע; די יונגע בלט. זיידן-בלאַנקדיקע, די

רייפע—אויבן האַריקע אָדער הוילע (דאָן טונקל-גרינע), אונטן זיידאָרטיקע, ווייסלעכע, לאַנצעט-לינעאַלע אָדער כמעט לינעאַלע, לאַנגע און שמאַלע מיט פאַרביגענע שפיצן אויף אונטן; די פעסטלעך מיט זיידענע הערע-לעך (פיג. 8. 2) קאַר ב. ה. *S. wiminalis* L. אין פייכטע ערטער, ביי די ברעג. אומעטום $\frac{1}{2}$ פרילינג.



פיג. 7.

(2 און 3) פורפורנער ה.; (4) שימלדיקער ה.; (6) שוואַרצווערנדיקער ה.

11 (9). אַנדעריקער קוסט 30—60 סמ., זעלטן העכער מיט אַ אונטערערדישן שטאַם און דינע בויגנאַרטיקע צווייגן. די בלט. זיינען מערסטנטייל שמאַל-לאַנצעטאָרטיקע, כמעט ליניאַלע; די פרענזלעך בשעתן בליען זיינען קליינע קוילאַרטיק-אייפאַרמיקע אָדער קורץ-צילינדרישע, גיט לענגער פון 2 סמ. (פיג. 8. 4) קריכנדיקער ה. *S. repens* L. אין פייכטע זאַמדיקע ערטער, אין זומפן. אומעטום. V—IV.


— דער געווקס האָט אַנאַנדער אויסזען — 12.

12. די יונגע בלט. געדיכט-האַריקע; רייפע פון ביידע זייטן אָדער פון אונטן געדיכט-האַריקע — 13.

— די יונגע בלט. הוילע, אַמאַל שיטער האַריקע; רייפע—הוילע, אונטן בלוי-לעכע ברייט-עליפטישע כמעט קיילעכדיקע; דאָס פיסל פון פרוכטקניפל לענגער פאַר די דעקבלט; די דעקבלט. העלברוינע, האַריקע; בייבלט. גירנפאַרמיקע ($1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ מ. די הייך) (פיג. 8. 5) בלוילעכער ה. *S. livida* Wahlenb. אין פייכטע ערטער, זומפן, צווישן קוסטעס. V—IV.

13. די קנאַספן זיינען באַדעקט מיט געדיכטע הערעלעך אָדער וואָל — 14.

- די קנאספן הוילע אָדער מיט שיטערע הערעלעך (פאַראַיאַריקע צווייגן הוילע) — 15.
14. אַ קוסט $3-1\frac{1}{2}$ מ. די הייך מיט גראַבע צווייגן; די בלט. לענגלעך-פאַרקערט-אייפאַרמיקע; רייפּע אויפן גרוילעך-האַריק, אונטן גרוילעך-וואַליקע; בייבלט. נירנאַרטיקע; די פרענזלעך זיציקע אָדער כמעט זיציקע,



פיג. 8.

- (1) לאפלאנדישער ה.; (2) קאַרב ה.; (4) קריכנדיקער ה.; (5) בלוילעכער ה.; (6) ציגענער.

- די פאַראַיאַריקע צווייגן קורץ-וואַליקע. שאַרער ה. *S. cinerea* L. אין פייכטע ערטער צווישן קוסטעס, אין וואַלד-זומפן. IV—V. אַ קוסט $1\frac{1}{2}-\frac{2}{3}$ מ. די הייך; די בלט. לאַנגעט אָדער פאַרקערט-לענג-לעכע; רייפּע בלט. זיינען אויפן גרוילעכע, אונטן באַדעקט מיט לאַנגע כמעט גלייכע הערעלעך. קיין בייבלט. ניטאָ. די פרענזלעך אויף באַ-בלעטערטע פיסלעך — גרויער ה. *S. glauca* L.
15. (13) אַ בוימ 3—10 מ. די הייך; בלט. גרויסע ברייטע, רייפּע זיינען אויפן אינ-גאַנצן הויל, אונטן גרוי-וואַליקע; די פרענזלעך זייער גרויסע, מענלעכע זי-ציקע, ווייבלעכע אויף באַבלעטערטע פיסלעך. די יונגע צווייגלעך — גרוילעך-האַריקע. (פיג. 8. 6.) ציגענער הושענא = בוימ *S. caprea* L. אין די וועלדער, צווישן קוסטעס. $\frac{1}{2}$ פריילינג.
- אַ קוסט 0,6—1,5 מ. די הייך; בלט. פאַרקערט-אייפאַרמיקע, גערונזלטע, אויפן האַריקע, מאַטע, אונטן מיט אַ גרוילעכן וואַליק און מיט אַן אַרויס-סטאַרטשענדיקער נעץ אָדערלעך; די פרענזלעך גרויסע אויף קורצע באַבלעטערטע פיסלעך; די יונגע צווייגן דין-סאַמעטענע; די בייבלט.

גרויסע, — אויערדיקער ה. *S. aurita* L. אויף פייכטע לאַנקעס
צווישן קוסטעס; אין זומפן V.

מאָפּאַל, הימלבוים *Populus* L.


1. די רייפּע בלט. פון ביידע זייטן הוילע — 2.

בלט. אונטן ווייט-וואַליקע (פאַרשיידנפאַרמיקע; ביים שפיץ בוים האַנט-
פאַרמיק 3—5 געלאָפּעטע, די איבעריקע קיילעכדיק-אייפאַרמיקע),
זילבער-ט. *P. alba* L. אין ווילדן צושטאַנד אויף פייכטע לאַנקעס,
און יונגע וועלדלעך, ביי
ברעגן, הויפטזעכלעך אין
דרום פוילן און גאַליציען.
ווערט קולטיווירט. $\frac{1}{2}$ פרי-
לינג.

די בלט. קיילעכדיקע אָדער
אייפאַרמיק-קרייזיקע, טעמפּ
געציינדלטע; די דעקבלט.
גרוי-האַריקע. שטפּ. גע-
ווינטלעך 8. אַ ס פ ע
P. tremula L. (פיג. 9).
אין וועלדער און וועלדלעך.
 $\frac{1}{2}$ פרילינג.

די בלט. אייפאַרמיק-קיי-
לעכדיקע, דרייעקיקע אָדער
פמעט ראַמבישע, קליין גע-
ציינדלטע; די דעקבלט.
הוילע; שטפּ. 12 — 30.

שוואַרצער ט. *P. nigra* L.
ווערט קולטיווירט. אַלס
פאַרשיידנאַרטיקייט קען מען
רעכענען דעם פיראַמי-
דאַלן ט. *P. pyramidalis*
Roz. מיט אַ קאָנוסאַרטיקער



פיג. 9.


- (1) א שפיץ פון א צווייגל מיט בלעטער;
- (2) א מענער פרענול; (3) א טייל פונם
פרענול מיט צייטיקע פרוכט;
- (a) א מענלעך בלימל פון פאַרנט;
- (b) פון א זייט; (c) א הייבלעך בלמ.
פון פאַרנט; (d) פון א זייט; (e) א גע-
עפנטע פרוכט; (f) א וויים.

קרוין. די צווייגן זיינען געווענדעט אין דער הייך און צוגעדריקט צום שטאַם.

אין די סעדער טרעפן זיך אויך די 2 פארשיידנארטיקייטן פונם שמעקנדיקן טאפאל: *P. balsamifera* L. און *P. suaveolens* Fisch. ביי וועלכע די קנאספן און יונגע בלט. זיינען שמעקנדיקע, קלעפיקע; די בלט. ברייט עליפטישע מיט א צילינדריש שטילכל, ביים באזיס פאר-קיילעכדיקטע אדער לייכט הארצפארמיקע, הוילע.

משפחה בעראזעדיקע Betulaceae

הארנבוים *Carpinus* L. א בוים 7—14 מ. די הייך (ועלטן א קוסט) מיט ווייסלעך-גרויע קארע. די בלט. אייפארמיק-לענגלעכע 5—12 רמ. די לענג.



פיג. 10.

הארנבוים *Carpinus betulus*.

- (1) א בליענדיק צווייגל; (2) מענלעכע בלט; (3) שטויבפאדיס; (4) הייבלעכע בלט; (5) הייבלעכע בלט. אן א שופל; (6) פרוכט.

דער צוגאב ביים פרוכט 3 געלאפעט מיט א לאנגן מיטעלן טייל. (פיג. 10) געוויינטלעכער ה. *Carpinus betulus*. אין בלעטער און געמישטע וועלדער. אומעטום אין אונזער געגנט IV—VI.

נוסבוים *Corylus* L. (פיג. 11) בלט. קיילעכדיק-פארקערט-אייפאר-מיקע, ביים שפיץ געוויינטלעך ווי אפגעשניטן און גלייך אויסגעצויגענע אין א שפיץ. א קוסט 2—4 מ. די הייך. וואלד נוסבוים *C. avellana* L. אין די וועלדער און צווישן קוסטעס. III—IV.


בעראזע Betula Tourn

1. קליינע קוסטעס; בלט. טעמפע, קורצשטילכלדיקע, כמעט זיציקע. אלע פרענולעך שטייענדיקע; די קארע גרויברוינע — 2. פיימער; בלט. שארפע אדער פארשארפטע, אויף לאנגע שטיל-כלעך; די שטפ. פרענולעך אראפהענגענדיקע, די פעסטלדיקע שטייענדיקע; קארע ווייסע — 3.

2. די בלעטער עליפטישע אָדער קיילעכדיק-אייפאָרמיקע (פיג. 12. 1) ציינדלדיק-געקארבטע; די צווייגן מיט בראָדעווקעס; די פרענולעך אויף פיסעלעך — נידעריקע ב. *B. humilis* Schrnk. אין טאָרף-זומפן. V. — בלט. קיילעכדיקע, געקארבטע (פיג. 12. 2); צווייגן אָן בראָדעווקעס; די פעסטל-בליג זייענע. — אמעריקאנישע (קארליק) ב. *B. nana* L. אין זומפיקע וועלדער און קוסטעס.

V—IV

3. בלט. יונגע, ווייך-האַריקע, שפע-יזער פמעט לעדערדיקע, גלאטע, אייפאָרמיקע; דער פליגל די זעלבע ברייט, ווי די פרוכט. — האַריקע ב. *B. verrucosa* Ehrh. (פיג. 13). V—IV. (*B. alba*) אַלבע. בלט. קיילעכ-דיקע אָדער קיילעכדיק-פאָרקערט-אייפאָרמיקע, טעמפע אָדער אויבן מיט אַ קארב, חוילע; די יונגע צווייגן און די קנאָספן הוילע — קלעפיקע א. *A. glutinosa* Gaertn. (פיג. 14). אין פייכטע ערטער, ביי ברעגן. IV—III.



פיג. 11.

— נום בוים *Corylus*.

— בלט. אייפאָרמיקע אָדער אייפאָר-מיק-עליפטישע, שאַרפע אָדער פארשיצטע, אונטן געוויינטלעך געדיכט-האַריקע; די יונגע צווייגן און קנאָספן גרויזאָליקע — גרויע אַלבע *A. incana* L. צווישן קוסטעס, ביים ראַנד פון וואַלד. IV—III.

משפחה בוקענע Fagaceae

די מעגלעכע בלמ. אין קעפלעך; בלט. גאנצראַנדיקע — וואַלד-בוק *Fagus silvatica* L. (פיג. 15) אַ בוים. אין בלעטער-וועלדער. V—IV

— די מענלעכע בלם. אין פרענזלעך; די בלט. געלאָפּעטע — דעם ב.
Quercus L. אַ בויס אָדער אַ קוסט:

— בלט. מיט זייער קורצע שטילכלעך (פיג. 16, 2); די פרוכט —

אויף פיסלעך לענגערע, ווי די
בלט. שטילכלעך — געוויינט-

לעכער ד. *Q. pedunculata*. Ehrh.
אין וועלדער, פארקן.


בלט. אויף לענגערע שטילכלעך
($\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{8}$ פון בלאטפאַך); די

פרוכט כמעט זיציקע אָדער אויף
פיסלעך, קירצער ווי די בלט.



פיג. 13.

געוויינטלעכע בעראָזע *Betula alba*



פיג. 12.

בלעמער פון בעראָזעס.

שטילכלעך ווינטערדיקער ד. *Q. sessiliflora Sm.* (פיג. 16, 1)
אויף אַ קאַלץ-באַדן.

משפּחה אולמענדיקע, Ulmaceae

1. בלם. און פרוכט כמעט זיציקע; די פרוכט-פליגל זיינען ביי די ראַנדן
גלאַטע — 2.

— בלם. און פרוכט אויף לאַנגע הענגענדיקע פיסלעך; די פרוכט-פליגל
זיינען ביי די ראַנדן האַריקע. אַ בויס — צעוואָרפענע אולמע
Ulmus effusa Wild. (U. pedunculata). אין וועלדער. IV—V.

2. אַ פליגל-פרוכט מיט אַ קערנדל, וואָס געפינט זיך אין מיטן אָדער נידע-


ריקער מיט א קארב אויפן שפיץ; יונגע צווייגן כמעט וואָליקע. אַ בוים —
באַרג א. *U. montana* Wild. (פיג. 17). אין וועלדער. III—IV.
דאָס קערנדל ליגט העכער פון דער מיט פליגלפּרוכט; דער קארב דער-
גרייכט כמעט ביז אים; די צווייגן הוילע אָדער כמעט הוילע; אַ בוים
אָדער אַ קוסט — פּעלד א. *U. campestris* L. אין וועלדער. III—IV.

משפּחה שטיינברעכערדיקע Saxifragaceae

בלט. איימאַרמיק-עליפּטישע פאַרשפיצטע, קליין געצינדלטע, אויפן
גלאַטע, אונטן אויף די אָדערלעך שאַרטסקע — ווילדער זשאַסמין
Philadelphus coronarius L. ווערט קולטיווירט אין די סעדר. V—VI.

וויינפערלעך, אַגרעסן *Ribes* L. קוסטעס.

1. די צווייגן מיט שטעכלקעס, וואָס
זיצן ביים באַזיס פון די בלעט;
בלמ. איינציקווייז אָדער צו 2—3
אויף איין געמיינזאַם פיסל; פּרוכט-
עליפּטישע גרינע אָדער רויט-
ברוינלעכע — אַגרעס *R. gros-*
sularia L. ווערט קולטיווירט
אין די סעדר. IV—V.
צווייגן אָן שטעכלקעס; די בלמ.
אין הענגלעך; פּרוכט קוילאַר-
טיקע — 2.




פיג. 14.

אַלכע, *Alnus glutinosa* Gaertn.

סמאַראַדינע *R. nigrum* L. אין פייכטע ערטער אין די וועלדער, —
ווערט קולטיווירט. IV—V.
בלט. אָן דריזן פון אונטן; דאָס בעכ. טעצלאַרטיק; די יאַגדעס רויטע
אָדער ווייסע — 3.

3. די בלט. פון אונטן היילע, אָדער נאָר אויף די אָדערלעך האָריקע; בלמ. איינגעשלעכטלעכע; צווישטוביקע; די דעקבלט. לענגער פון די בלמ. פיסלעך — אַל פּי שַׁע וויינפערלעך *R. alpinum* L. צווישן קוסטעס, אויפן ראַנד פון וועלדער. V —



פיג. 15.


בוק *Fagus* (1) אַ בליענדיקע צווייג; (2) מענלעכע בלמ; (3) אַ ווייבלעכער געבליט אין דורכשניט; (4) אַ קווערשניט דורך די פרוכטקנ. פון 2 בלמ; (5) פרוכט; (6) דאָס ניסל.

די בלט. פון אונטן האָריקע; בלמ. צווייגעשלעכטלעכע; דעקבלט. קירצער פון די בלמ. פיסלעך — רויטע (ווייסע) וויינפערלעך *R. rubrum* L. ווערט קולטיווירט אין די סעדער; אין ווילדן צושטאנד צווישן קוסטעס, אין וועלדער.

משפחה ראָזנבלומיקע Rosaceae

ווערט אָפט געטיילט אויף עטלעכע משפחות: ראָזנבלומיקע אין ענגן זין — *Rosaceae*, ביינלדיקע — *Amygdaleae* און עפלדיקע *Pomaceae*.

1. די בלט. צוויי אָדער דרייפּעדערדיקע; בלמ. געלבלעך ווייסע, קליינע, צוויי־שטוביקע וואָלד־ציגנפּאָרד *Aruncus silvester Kostel.* אין וועלדלעך און צווישן קוסטעס.
- די בלט. איינפאכע אָדער נאָר איינמאָל געפּעדערטע — 2.
2. דער שטאַם און די צווייגן האָבן קורצע (ניט לענגער פון 6—7 מילי־מעטר) נאָר שאַרפע אָפט איינגאַרטיק פאַרבויענע שיפּן — 3.
- דער שטאַם און די צווייגן זיינען גלאַטע, אָדער האָבן לאַנגע שטאַרקע הילצערנע שיפּן — 4.
3. בלמ. גרויסע (5 סט. אין דיאַמעטער און מער); די בלמ.־בעט קריגלאַרטיק,



פיג. 16.

- (1) בלאט פונעם היינטערדיקן דעמב *Q. sessiliflora*
- (2) פון געוויינטלעכן דעמב *Q. pedunculata*

- שטאַרק אַריינגעבויען און פאַרברייטערט אין מיטן; די פרוכט וועל באַפאַרעכט מיט אַ ביסל פליישיקע ווענטלעך און אַ סך קערנדלעך אינווייניק — ראָזע *Rosa*.
- די בלמ. אַ סך קלענער; די בלומענבעט אַרויסגעבויען; זאָפטיקע פרוכט, וועלכע באַשטייט פון אַ סך ביינדל־פרוכטלעך. — מאַלינע־קוסט און אַנדערע ענלעכע צו זיי געוויקסן *Rubus*.
- 4 (2). בלמ. געלע; דאָס בעכ. פון 10 בלט, וואָס זיצן אין 2 רייען — פינגער בלאט *Potentilla*.
- בלמ. ווייסע אָדער ראָזע; דאָס בעכ. פון 5 בעכ. בלט. — 5.

5. 5 פרוכטקן. זיצן אָפּן. אָדער נאָר מיטן באַזיס אַריינגעשטעלט אין בלם=בעט; בלם. קליינע אין אַ געדיכט שילדל אָדער בעזימל —

ספירעע *Spiraea*.

— די פרוכטקן. זיינען באַהאַלטן אין אַ שטאַרק אַריינגעבויענער בלם=בעט אָדער דאָס פרוכטקן. אונטערשטעליק; די פרוכט, אַ זאָפטיקע פליי-

שיקע, זעלטן נוסאַרטיקע — 6.

6. בלט. געלאָפּעטע אָדער קאָמפּלי-

צירטע — 7.

— בלט. גאַנצע — 8.

7. שטעכעדיקע קוסטעס; די פרוכט

מיט עטלעכע ביינדלעך — דאָרן

Crataegus.

— ביימער, זעלטן קוסטעס אָן

שטעכלקעס—קערנ פרוכט (ראַ=

בענע בויים) *Pirus*.

8 (6). דאָס פעסטל מיט 1 גריפל; דאָס

פרוכטקן. זיצט אויפן דעק פון

אַ שטאַרק אַריינגעבויענער בלם=

בעט, נאָר אינגאַנצן אַ פרייע

(פיג. 18. 2) די פרוכט אַ זאָפטיקע

ביינדלפרוכט — קאַרשן, פלוי=

מען *Prunus*.

— אַ אונטערשטעליק פרוכטקן. (פיג. 18. 3); גריפלעך 2—5; פרוכט פליישיקע

אָדער מעליקע — 9.

9. די פרוכטקן. צווישן זיך ניט צענויפגעוואַקסן. קליינע קוסטעס—פרייער-

קוסט *Cotoneaster*.

— די פרוכטקן. צענויפגעוואַקסן — עפל, בערנעס *Pirus*.

ספירעע *Spiraea* L. קוסטעס.

1. בלט. געפעדערטע מיט לענגלעך=לאַנצעטפאָרמיקע צווייגעצינדלטע בלעט=

לעך; בלם. ווייסע אין אַ געדיכטן פיראַמידאַלן בעזימל — ראַבינעאַר=

טיקעס. *S. sorbifolia* L. ווערט קולטיווירט. זעלטענער אין ווילדן


צושטאַנד. VII—VI.



פיג. 17.

באַרג-אולמע *Ulmus montana*

- בלט. גאנצראנדיקע אָדער ניט טיף דרייגעלאָפּעטע — 2.
 2. בלט. דרייגעלאָפּעטע און צווייאַיק געצינדלטע מיט בייבלט. וואָס פאַלן
 גרינג אַראָפּ — בלעזל אַרטיקע ס. *S. opulifolia* L. ווערט קולטי-
 ווירט און טרעפט זיך אין ווילדן צושטאַנד. VII—VI.
 בלט. אָן בייבלט. — 3.
 3. בלמ. ראָזע — חושענא = אַרטיקע ס. *S. salicifolia* L. צווישן
 קוסטעס און וועלדער, ווערט אויך אָפט קולטיווירט.
 בלמ. ווייסע — 4.
 4. צווייגן צוגעפלעצטע; בלט. פאַרשפיצטע, כמעט פונם באַזיס אָדער פון



פיג. 18.

פאַרשירענע פרוכטניפלעך ביי ראָזנבלוטיקע.

- דער מיט געצינדלטע — אולמע אַרטיקע ס. *S. chamaedrifolia* L.
 אין ווילדן צושטאַנד אַרום ווילנע, ווערט אויך קולטיווירט. VI—V.
 צווייגן קיילעכדיקע. בלט. טעמפע, נאָר ביים שפיץ מיט עטלעכע ציינ-
 דלעך — מיטעלע ס. *S. media* Schm. אויף שטיינערדיקע ערטער.

פייערקובט, *Cotoneaster* Medic. קוסטעס.

- בלט. קיילעכדיק אייפאַרמיקע, גאנצראנדיקע, ווייס-וואַליקע;
 בלמ. ווייס-ראָזע פרוכט רויטע אָדער שוואַרצע — געוויינטלעכער פ.
C. vulgaris Lindl. — אויף היגלען, צווישן קוסטעס, הויפטזעכלעך
 אויף אַ קאַלכיק-שטיינערדיקן באַדן. VI—IV.

עפלבויים, בערנעבויים, ראבינעם *Pirus Tonrn*.

בלט. פעדערדיק צוזאמענגעזעצטע; בלמ. וויסע, אין געדיכטע הענגלעך; גריפלעך 3 (זעלטן 4); פרוכט רויטע — געוויינטלעכע ראבינע *P. aucuparia Gaertn.* ווערט קולטיווירט; אין ווילדן צושטאנד אין וועלדער, יונגע וועלדלעך, צווישן קוסטעס. VI—V. בלמ. איינפאכע; 5 גריפלעך ביים באזיס אדער ביז העלפט צענויפגע-וואקסן צווישן זיך; בלמ. ראָזלעכע; שטויבזעקלעך געלע — עפלבויים *P. malus L.* ווערט קולטיווירט. אין ווילדן צושטאנד אין וועלדער, יונגע וועלדלעך און צווישן קוסטעס $\frac{2}{2}$ פרילינג.

גריפלעך (זיילכלעך) פרייע, בלמ. וויסע; בלמ. קיילעכדיקע אדער איי-פאָרמיקע, קליינגעציינדלטע; די נאָך ניט געעפנטע שטויבזעקלעך רויטע — געוויינטלעכער באַרנבויים *P. communis L.* ווערט קולטיווירט אין ווילדן צושטאנד אין וועלד-לעך, אויפן ראָנד פון וואַלד, צווישן קוסטעס $\frac{2}{2}$ פרילינג.


דאָרן, *Crataegus L.*
קוסט.

גריפלעך 1—2. פרוכט מיט 1—2 ביינדלעך בלמ. אייפאָר-מיקע, פאָרקערט-אייפאָרמיקע אדער כמעט קיילעכדיקע, אונטן בלאַס-גרינע. פרוכט רויטע — שטעכעדיקער ד. *C. oxya-* *cantha Gärtn.* צווישן קוס-טעס און אויף אָפענע ערטער.

VI—V. ביי אונז איז מער פאַרשפרייט דער שפיציקער דאָרן *C. monogyna* מיט טיף איינגעשניטענע בלמ. און 2 גריפלעך.

מאָלינעם *Rubus L.*

1. אַ קוסט, וועלכער לאָזט אַרויס חוץ בליענדיקע צווייגן אויך יונגע צווייגן, וואָס בליען ערשט איבעראַיאָר. אויף די לעצטע צווייגן זיינען די בלמ. פעדערדיק-צוזאמענגעזעצטע (5—7 אייפאָרמיקע בלמ.); די פרוכט



פיג. 19.

עכטע מאָלינעם *R. idaeus L.*

העל-רויטע (ביי אייניקע קולטיווירטע געוו. געלבלעך-ווייסע) ווען זיי זיינען צייטיק, טיילן זיי זיך לייכט אָפּ פון זייער בלם-בעט; בלם. ווייסע. עכטע מאַלינעס *R. idaeus L.* (פיג. 19). צווישן קוסטעס, אין וועלדלעך, ווערט אָפט קולטיווירט.

אלע בלט. האנטפאָרמיקע פון 3—5—7 בלט, דערביי האָט דאָס מיטל-סטע בלט. אַ לענגערן שטילכל; פרוכט שוואַרצע, שוואַרץ-פּיאָלעטע אָדער טונקל-רויטע, וועלכע פאָלן אַראָפּ צוזאַמען מיט דער בלם. בעט. 2 —

2. בייבלט. לאַנצעטפאָרמיקע אָדער

לאַנצעט-לינעאַלע — 3.

— בייבלט. לינעאַלע, אָדער פאָדמ-

אַרטיקע — 4.

3. בלט. געוויינטלעך דרייאַיקע, אויבן

מער אָדער ווייניקער האַריקע;

בעכערבלט. זיינען צוגעדריקט צו

די פרוכט. — שוואַרצע מאַלי-

נעס (אַזשענעס) *R. caesius L.*

(פיג. 20). אויף היגלען, אַראָפּ-

האַנגען פון גראַפּנס.

בלט. פון 3—5 בלעטלעך, אויבן

כמעט הוילע אָדער מיט שיטערע

הערלעך; די בעכערבלט. זיינען אָפּגעבויגן פון די פרוכט. — וואַלד אַ.

R. nemorosa Hayne (*R. dumetorum*) צווישן קוסטעס.

4. שיפן דינע, גלייכע; בלט. אויבן כמעט הוילע; שטם. לענגער פאַר די

פעסטלעך; פרוכט טונקל-רויטע. גלייכשטענדיקע אַ. *R. sube-*

rectus Anders (פיג. 21). צווישן קוסטעס און וועלד-

לעך VI—VIII.

— שיפן פעסטע, צוגעפּלעצטע, אָפט אַיינגעבויגענע; די שטם. ניט לענגער

פאַר די פעסטלעך—פאַלדנבלעטערדיקע אַ. *R. plicatus W. et N.*

פּינגערבלאַט *Potentilla L.*

אַ קוסט 30 סמ. 1—מ. די הייך מיט האַריקע יוגע צווייגן; בלם. געלע;



פיג. 20.

שוואַרצע מאַלינעס (אַזשענעס)
Rubus caesius.

בלט. צוזאמענגעזעצטע פון 2 זעלטן פון 3 פאָר גאַנצראַנדיקע זייטיקע
בלט. כמעט לאַנצעט-פאָרמיקע; די בלט. פון דער אויבערשטער פאָר ביים
באָזיס צונויפגעגאַסן. — קוסטנדיקע פ. *P. fruticosa* L. צווישן
קוסטעס, זומער.

ראָזע *Rosa Tourn.* קוסטעס.

די באַשטימונג פון די אַרטן ווערט פאַרשווערט צוליב דער גרויסער צאָל
געמישן און פאַרשיידנאַרטיקין.

1. בלמ. מיט דעקבלט. — 2.

— בלמ. אָן דעקבלט. — 3.

2. בלמ. ווייסע אָפט אַביסל געלבלעכע אָדער ראָזלעכע; די טיילן פונם



פֿיג. 21.

Rubus fruticosus. אָזשענעס גלייכשטענגלדיקע

בעכ. גאַנצע; פרוכט שוואַרצע — פרויען ר. *R. pimpinellifolia* L.

צווישן קוסטעס; אויפן ראָנד פון וועלדער V—VI.

— בלמ. געלע; די אויסערלעכע טיילן פונם בעכ. פעדערדיק-אַיינגעשניטענע;

פרוכט ברוין-רויטע — געלע ר. *R. luteax* Mill. ווערט קוילטווירט.

3(1). די טיילן פונם בעכ. גאַנצע — 4.

— די אויסערלעכע טיילן פונם בעכ. פעדערדיק אַיינגעשניטענע — 5.

4. אַלע שיפן גלייכע אָדער כמעט גלייכע, דינע, כמעט איין גרויס; בלמ.

רויטע; בלם. פיסלעך באדעקט מיט שטענגלארטיקע דריזן. — נאָדל = דיקע ר. *R. acicularis Lindl.* — צווישן קוסטעס; אין וועלדלעך.
— ביים באַזיס פון די בלם. שטילכלעך זיצן פאַריקע, פעסטע אַיינגעבויגענע שיפן. די איבעריקע שיפן אַלאַרטיקע אָדער האַראַרטיקע; די בלם. פיסלעך הוילע. — צפונדיקע ר. *R. cinnamomea L.* — אויף אָפענע ערטער, צווישן קוסטעס V—VI.

5(3). די בלם. ביי די ראַנדן איינמאַל זעגאַרטיק געצינדלט — 6.
— די בלם. ביי די ראַנדן צווייאַק זעגאַרטיק געצינדלט — 7.
6. די יונגע צווייגן מיט אַיינגעבויגענע ביים באַזיס פאַרברייטערטע שיפן; די בלם. בלאַסע; בלם. פיסלעך זייער לאַנגע; בלם. פורפורנע 20—50 סמ. די הייך. — נידעריקע ר. *R. pumila L.* — צווישן קוסטעס, אין יונגע וועלדלעך. זייער נאָענט צו דעם אַרט זיינען די פראַנצויזישע ר. *R. gallica* און די געפילטע ר. *R. centifolia* וועלכע ווערן קול-טיווירט אין אונזערע סעדר.
— די שיפן סערפנאַרטיקע; בלם. העל-ראָזע אָדער ווייסע. — הינטישע (ווילדע) ר. *L. canina R.* — אויף די היגלען; צווישן קוסטעס. האָט זייער אַ סך נאָענטע פאַרמען.

7(5). די בלם, באַזונדערס די אונטערשטע זייט, זיינען געדיכט באַדעקט מיט הערעלעך. — האַריקע ר. *R. villosa L.* — אויף היגלען, צווישן קוס-טעס, ביי וועגן. האָט אַ גרויסע צאָל נאָענטע פאַרמען.
— די בלם. הוילע אָדער מיט קליינע הערעלעך, צווישן וועלכע ס'זיצן שטענגלאַרטיקע דריזן. — וויין ר. *R. rubiginosa L.* — צווישן קוס-טעס, אויף שטיינערדיקע ערטער V—VI. האָט אַ סך נאָענטע פאַרמען.

פלויםען, קארשן, טרויבנקאַרשנבוים, *Prunus Tourn.*

1. ווייסע בלם. איינציקווייז אויף אַראָפהענגענדקיע הענגלעך; פרוכט שוואַרצע; בלם. אין דער יוגנט צענויפגעלייגטע אין דער לענג — טרויבנקאַרשנבוים *P. padus L.* — צווישן קוסטעס, אין וועלדער, מערסטנטייל אויף אַ פייכטערן באַדן. ווערט אויך קולטיווירט.
— בלם. איינציקע אָדער צו עטלעכע אין שירמאַרטיקע פינטלעך, וועלכע זיצן אָפט אויף אַ בשותפותדיקן בלם. פיסל — 2.
2. בלם. אין דער יוגנט צענויפגעוויקלט אין אַ רערל; פרוכט מיט אַ בלוז-לעכן אָנהויך — 3.

בלט. אין דער יונגט צענויפגעלייגט אין דער לענג; פרוכט אָן אַ בלויע לעכץ אָנהויך — 4.

3. בלמ. מערסטנטייל איינציקע, קליינע; די צווייגן מיט שיפן; פרוכט אויף אַ גלייך פיסל. — דאָרנדיקער פלוימענבוים *P. spinosa* L. — אויף היגלען, צווישן קוסטעס, אין סטעפעס, הויפטזעכלעך אין דרום און דרום-מערב פוילן.


פרוכט אַראָפהענגענדיקע, טונקל-בלויע, רויטלעכע אָדער געלע; דאָס ביינדל צוגעפלעצט מיט אַ שאַרפן ראַנד — פלוימענבוים *P. domestica* L. (פיג. 22). ווערט קול-טיווירט, אַמאָל אויך אין ווילדן צושטאַנד.

4. יונגע בלט. פון אונטען געדיכט-האַריקע, שפּעטער שיטערער, גאַנץ גראָב געציינדלטע מערסטנ-



פיג. 22.

פלוימענבוים
Prunus domestica



פיג. 23.

זיסער קאַרשנבוים
(משערעשנע) *Prunus avium*

טייל מיט אַ גאַנצראַנדיקן שפיץ — זיסער קאַרשנבוים (משערעשנע) *P. avium* L. (פיג. 23).

בלט. עליפטישע ביזן שפיץ צווייגעציינדלטע, אויבן שטאַרק פלאַנקנדיקע;

בלם. וויסע — גארטנדיקער קארשנבוים, *P. cerasus* L. קולטיווירט. V—IV. (פיג. 24).

משפחה זומערפויגלדיקע Papilionaceae.

1. אלע 10 שטפ. צענויפגעוואקסן מיט די פעדים — 2.
- 9 שטפ. צענויפגעוואקסן און איינער (דער אויבערשטער) א פרייער — 4.
2. דאָס קר. פון 1 אויבערשטן טונקל-רויט-פיאלעטע בליטל; שטפ. לענגער פאר אים; בלם. אין לאנגע געדיכטע הענגלעך אויף די עקן פון די צווייגן —
- אמאָרפּה *Amorpha* L.
- דאָס קר. פון 5 בליטן, טיפּ —
- שע פאר דער משפחה — 3.
3. בלט. איינפאכע — *Genista* L.
- בלט. דרייאיקע — דריי —
- בלאט-קוסט, קאָני —
- טינע קוסט *Cytisus* L.
4. די שויטן צוגעפלעצטע —
- טקאציע *Robinia* L.
- די שויטן צילינדרישע, הוילע — געלע אקאציע
- Caragana* Lam.



פיג. 24

געניסמע *Genista* L.
קוסטעס.

זייער אינטערעסאנט די באַ-
שטיבונג: אונטער דער
שווערקייט פונם אינזעקט
בייגט זיך דאָס שיפעלע

גארטנדיקער קארשנבוים. *Prunus cerasus*.

צוזאמען מיט די רודערס אַראָפּ, און די עלאסטישע שטפ. גלייכן זיך
גלייך אויס און וואָרפן אַרויס אויף אויבן אַ גאַנץ וואָלקנדל שטויב.
דער זעגל איז פונדרויסן זיידן-האַריק; בלט. אויפן הוילע, אונטן האַריקע;
די צווייגן אויך האַריקע. האַריקע ג. *G. pilosa* L. אויף טרוקענע היגלען.

- דער זעגל — א הוילער; דאָס שטענגל מיט געצווייגטע שטעכלקעס; בלט.
און דאָס בעכ. האַריקע — שטעכלקע ג. *G. germanica L.* אין
וועלדער, צווישן קוסטעס V—VI.
- דאָס שטענגל אָן שטעכלקעס — פאַרבנדיקע ג. *G. tinctoria L.*
אין וועלדער, צווישן קוסטעס, אויף זאַמדיקע ערטער V—VIII.
- דרייבלאָט קוסט (קאַנישינע קוסט) *Cytisus L.*
בלמ. אויפן שפיץ שטענגל אויף אַנפּלעטערדיקע הענגלעך — שוואַרצער ד.
C. nigricans L. אין וועלדער, צווישן קוסטעס.
- בלמ. פאַכוועדיקע, מערסטנטייל צו 2; צוויי קאָלירנדיקער ד.
C. biflorus L'Herit. צווישן קוסטעס, אויף לאַנקעס IV—VI.
- בלמ. אין קעפלעך — עסטרייכישער ד. *C. austriacus L.* צווישן
קוסטעס, אויף לאַנקעס, היגלען. V—VII.
- אַמאָרפּע *Amorpha L.*
אַ קוסט 1—1½ מ. די הייך. קוסטאַרטיקע א. *A. fruticosa L.*
ווערט געזעצט אין די סעדער; טרעפט זיך אויך אין ווילדן צושטאַנד.
- אַקאַציע *Robinia.*
בלומען — ווייסע, שמעקנדיקע — ווייסע א. *R. pseudacacia K.*
ווערט קולטיווירט.
- געלע אַקאַציע, פֿיפּעלעך *Caragana arborescens L.*
בלט. פעדעריק-צוזאַמענגעזעצטע; ווערט קולטיווירט, טרעפט זיך אין
ווילדן צושטאַנד. IV—V.

משפּחה שפינדלבויםערדיקע Celastaceae.

שפינדלבוים *Evonymus L.*

- צווייגן קיילעכדיקע, באַדעקט מיט שוואַרצע בראַדעווקעס. זוימען שוואַרצע,
ביז העלפט זיצנדיקע אין אַ רויטן צוגאַב — קרעציקער ש. *E. ve-*
rucosa L. — אין וועלדער, יונגע וועלדלעך, צווישן קוסטעס V—VI.
- צווייגן פירקאַנטיקע, אָן בראַדעווקעס; זוימען ווייסע — אייראָפּע-
אישער ש. *E. europaea L.* אין יונגע וועלדלעך, אויפן ראַנד פון
וואַלד, צווישן קוסטעס IV—VI.


משפחה קליאנענדיקע Sapindaceae.

בלם. ווייסע אין א הענגל, וואָס הענגט אַראָפּ אויף אַ לאַנג פיסל.
א בעכ. פון 5 בלט; דאָס קר. פון 5 בליטן. דאָס פרוכטקנ. אויפער-
שטעליק. די פרוכט — א 2—3 געלאָפּעטע שאַכטעלע — עכטער פּימ-
פער נוס, טויטע קאָפּ *Staphylea pinnata* L. (ווערט אַנגערופן
טויטע קאָפּ צוליב דער ווייטער ענלעכקייט פון די פאַרטעמפטע קערנדלעך
צו אַ מענטשלעכן שאַרבן).

אין וועלדער, צווישן קוס-
טעס.

בלט. פינגערדיקע; דאָס
בעכ. 5 געציינדלט; בליטן
4—5. פרוכט — אַ שאַכטל,
באָדעקט מיט שיפן. פערד-
קאָשטאן *Aesculus Hip-*
pocastanum L. ווערט
קולטיווירט. V—VI.

דאָס קר. פון 5 בליטן
(מערסטנטייל גרינע); שטפ.
געוויינטלעך 8; פרוכט 2
פליגל = פרוכט. קליאָן
(נאָזבוים) *Acer* L.
(פיג. 25)



פיג. 25.
קליאָן (נאָזבוים).

1. בלט. 3—5 געלאָפּעטע — 2.

בלט. גאַנצע; אַמאָל אייניקע 3 געלאָפּעטע, אייפאַרמיקע, געציינדלטע;
בלם. גרינגלעך-ווייסע אין גלייכשטייענדיקע בעזימלעך; פליגלפרוכט ראָזע-
טאָטער שערק. *A. tataricum* L. — אין וועלדער, סעדער. V—VI.
די טיילן פונם בלאט געקארבט-געציינדלטע; בלט. גרויע אָדער בלו-
לעכע; די שטפ. אין די מענלעכע בלם. זיינען 2 מאָל לענגער פאַר די
בליטן. גרינע בלם. באַוויזן זיך נאָך די בלט. באַרג ק. *A. pseudo-*
platanus L. אין וועלדער, צווייטע העלפט פּרילינג.

די טיילן פון בלאט דין-פארשארפטע מיט 1—2 פארשארפטע ציינדלעך פון יעדער זייט; בלט. אונטן גרינע; שטפ. אין די מענלעכע בלם. פונקט אַוויפיל וויפל בליטן; בליטן געבלעך-גרינע. שאַרפּלעטערדיג קערק. *A. platanoides* L. אין וועלדער. V—IV.

משפחה פוילביימערדיקע Rhamnaceae.

בלט. קליינקארביק-געציינדלטע, אַנטקעגנדיקע; טיילן פון בלם. צו 4;



פּרוכט מיט 4, זעלטן 5 ביינדלעך — עכטער פוילבוים *R. cathartica* L. אין וועלדעך, צווישן קוסטעס.

בלט. גאַנצראַנדיקע, כסדר-דיקע; טיילן פון בלוס צו 5; פּרוכט מיט 2—3 ביינדלעך; — פּרוכטיקער פוילבוים *R. Frangula* L. אין וואַלד, צווישן קוסטעס. V—VI.

משפחה וויינטרויבנדיקע

Ampelidaceae.

בלט. האַנטפּאַרמיק-צוואַ-מענגעזעצטע; בליטן פרייע.

ווילדע וויינטרויבן *Vitis hederacea* Wild. ווערט געזעצט אַרום אַלטאַנקעס, אַרום פאַרקאַנעס, וועראַנדעס און ווענט. VII.

משפחה לינדנדיקע Tiliaceae.

די בלט-קנאַספּן האַריקע; בלט. אונטן ווייך-האַריקע; די ניסלעך מיט 5 בולטע זייטלעך — גרויס פלעטערדיקער לינדנבוים *Tilia grandifolia* Ehrh. (*T. platyphylla* Scop) אין וועלדער, סעזער, פאַרקן. (פיג. 26).

פיג. 26.
גרויסבלעטערדיקער לינדנבוים
Tilia grandifolia.

בלט. אונטן גרוילעכע; בלט. קגאספן הוילע; די בלט. נאָר אין די ווינקלעך — לען פון די בערוון האַריקע. די ניטלעך מיט ווייניק בולטע זייטלעך — קליינבלעטערדיקער ל. *T. parvifolia Ehrh. (T. cordata Mill)*

משפחה יאגדעדיקע Thymelaeaceae.

יאגדעלע *Daphne L.* בלמ. באַווייזן זיך פאַר די בלט.; בלט. פאַר-קערט = לאַנצעטפאָרמיקע, פאַלן אַראָפּ אויף ווינטער; יאגדעס רויטע. געוויינט-לעכע יאגדעלע *D. mesereum L.* אין אַנהייב פּרילינג (פיג. 27). בלמ. באַווייזן זיך צוזאַמען אַדער נאָך די בלט.; די בלט. בלייבן אויף ווינטער; יאגדעס שוואַרץ-ברוי-נע. ש מע ק נ ד י ק ע י. *D. cneorum L.* אין סאָסנע וועלדער. VI—V.



פיג. 27.

געוויינטלעכע יאגדעלע
Daphne mesereum.

משפחה גן-עדן

ביימערדיקע

Elaeagnaceae.

בלמ. צווייגעשלעכטלעכע געלע, גלעקלאַרטיקע, 4 גע-לאָפּעטע; דאָס ביינדל פונם פרוכט מיט 8 גראַפנדלעך; די בלט. פון ביידע זייטן זילבערשופיקע — זילבער-גן-עדן בויים *Elaeagnus argenteus Pursch.* אַ קוסט אַדער אַ בויים. ווערט קולטיווירט אין די דרומדיקע קאנטן. בלמ. צווייטשופיקע, ברוינלעכע; די מענלעכע טיף צווייגעטילטע, די ווייבלעכע טרייבלדיקע, 2 געלאָפּעטע; די בלט. אויפן גרינע; פרוכט

געבלעכע; דאָס ביינדל פון פרוכט מיט 1 גראָבנדל. דער געווי. מיט שטעכל-
קעס. דאָרנדיקער זילבערקוסט *Hippophae rhamnoides L.* —
אויף זאָמדיקע ברעגן. ווערט אויך קולטיווירט.

משפחה האַרט פּרענטנדיקע *Cornaceae.*

בלמ. ווייסע באַווייזן זיך נאָך דעם, ווי די בלט. האָבן זיך שוין אינגאַנצן
צעלאָזט. פרוכט קיילעכדיקע, שוואַרצע, ווען זיי ווערן צייטיק. — רויטער
האַרט פּרענט *Cornus sanguinea L.* ווערט קולטיווירט אין דרום
און דרום-מזרח פון פוילן.
בלמ. געלע, באַווייזן זיך פאַר די בלעטער; פרוכט לענגלעכע, רויטע —
עכטער ה. *C. mas L.*

משפחה סטעפנדיקע *Ericaceae.*

1. דאָס קר. גלעקלאַרטיק, אייפאַרמיק אָדער קוילאַרטיק — 2.
דאָס קר. ראָדאַרטיק פונאַנדערגעשפרייט, 4 געטיילט; דאָס שטג. מיט
פאַדימאַרטיקע קריכנדיקע צווייגלעך; בלט. לענגלעך-אייפאַרמיקע, לע-
דעראַרטיקע מיט פאַרבייגענע ראַנדן, אונטן בלוילעכע. בלמ. זיצן איינ-
ציקווייז אויף לאַנגע פיסלעך. די יאָגדע אַ רויטע — זשוראַווינעס
(*Vaccinium Oxyc. L.*) *Oxycoccus palustris Pers.* (זשאַראַכלינעס)
אין טאַר-זומפן.
2. דאָס פרוכטקנ. אויפערשטעליק; דאָס קר. 4 געציינדלט; בלמ. קליינע,
ראָזע; די בלמ. היילע הייטלדיקע; פרוכט אַ שאַכטעלע — געוויינטלעכע
סטעפנאָר *Erica (calluna) vulgaris Salisb.* אויף זאָמדיקע
ערטער, אין סאַסנע וועלדער X—VI.
דאָס פרוכטקנ. אונטערשטעליק; פרוכט אַ יאָגדע. — ברוסניצעס,
שוואַרצע יאָגדעס *Vaccinium.*

ברוסניצעס, שוואַרצע יאָגדעס *Vaccinium L.*

1. דאָס קר. 5 געציינדלט; שטפ. 10; פרוכט שוואַרצע; בלט. פלאַכע, פאלן
אַראָפּ אויף ווינטער — 2.
— דאָס קר. 4 געציינדלט; שטפ. 8; פרוכט רויטע; בלט. מיט פאַרבייגענע
ראַנדן, שטאַרק לעדעראַרטיקע, בלייבן איבער אויף ווינטער; בלמ.

ווייסע אין שפיץ-הענגלעך. — ברוסניצעס *V. vitis idaea L.* אין סאָסנע וועלדער.

2. בלט. אייפאַרמיקע אָדער לענגלעך-אייפאַרמיקע, קליין-געציינדלטע; דאָס קר. גרינבלעך-ווייס מיט אַ ראָזן ניואַנס — שוואַרצע יאָגדעס *V. myr-*
tillus L. אין וועלדער, מערסטנטייל אין נאָדל-וועלדער. *VI—V.*
בלט. גאַנצראַנדיקע עליפטישע אָדער פאַרקערט-אייפאַרמיקע; דאָס קר.
ווייס, געוויינטלעך מיט אַ ראָזן ניואַנס — זומפּ-יאָגדעס, בויכעס,
פיאָניצעס *V. uliginosum L.* אויף טאָרף-זומפּן. *VI—V.*

משפּחה איילבערטנדיקע *Oleaceae.*

קלאָרבוים, העשעבוים, יאָסען *Fraxinns.*

די פליגלפּרוכט אויפן שפיץ טעמפע אָדער מיט אַ איינפייגונג. אַ בוים.
געוויינטלעכער ק. *F. excelsior L.* אין וועלדער און וועלדלעך.

באַ *Syringa.* אַ קוסט.

געוויינטלעכער מ. *S. vulgaris.* אין סעדער. אַמאָל אויך אין
ווילדן צושטאַנד. *I—V.*

ליגוסטער *Ligustrum.* אַ קוסט.

געוויינטלעכער ל. *L. vulgaris L.* ווערט קולטיווירט. אַמאָל
אויך אין ווילדן צושטאַנד צווישן קוסטעס, אין וועלדלעך. *VI—V.*

משפּחה ציגנבלעטערדיקע *Caprifoliaceae.*

1. אַ איינפאַך מיילכל; בלט. גאַנצע — 2.

— אַ דרייאַק מיילכל בלט. געפּעדערטע אָדער געלאָפּעטע — 3.

2. בלם. פאַריקע אָדער אין אַ קעפל-געבלים; דאָס קר. טרייבל-לייקעאַרטיק,
פּמעט אַ צוויילפּנדיקס. — ציגנבלאַט, וואָלפישע-יאָגדעס
Lonicera L.

— בלם. אין הענגלעך; דאָס קר. גלעקלאָרטיק, פּמעט רעגלמעסיק, אינוויי-
ניק האַריק. ווי מיט וואַטע, פּרוכט ווייסע. — שניי-יאָגדעס
Symphoricarpos racemosa Michx. ווערט קולטיווירט. *VIII—VII.*

3. דער געבליס — אַ שילדל; בלם. ווייסע; בלט. אומפאָריק געפּעדערטע, — האָלונדער *Sambucus*.

— בלט. געלאָפּעטע — שניי קויל, שליפל, קאַלינע בויס *Viburnum*

שנייקויל, שליפל, קאַלינע בויס *Viburnum*. בלט. דרייגעלאָפּעטע; די אויסערלעכע בלם. אָנגעשלעכטלעכע, עטלעכע מאָל גרעסער פאַר די איבעריקע, ראָדאַרטיקע; די אינווייניקסטע גלעקלאָרטיקע, צווייגעשל. פּרוכט העל-רויטע — שניי קויל *V. opulus L.* אין וועלדער, צווישן קוסטעס; מערסטנטייל אין פייכטע ערטער. VI—V.

צינגבלאָט, וואָלפישע יאָגדעס *Lonicera L.*

1. זיך פלעכטנדיקע קוסטעס; בלם. אין קעפלעך אויף די שפיצן צווייגלעך געלבלעכע אָדער ראָזע — 2.

— גלייכשטייענדיקע קוסטעס; בלם. פאָרווייז אין די פאָכוועס פון די בלט. — 3.

2. די אויבערשטע בלט. אויף די פליענדיקע צווייגלעך זיינען צווישן זיך צענויפגעוואַקסן מיט זייער באַזיס. גאָרטן-צינגבלאָט *L. capri-*

folium L. ווערט קולטיווירט. מע באַנוצט אים אָפּט אָנשטאָט ווילדע וויינטרויבן ביי וועראַנדעס (אין ווילנע. אין זאַקערטער דאָטשעס) VI—V, אַלע בלט. פרייע. — געוויינטלעכער (וואַלד) צ. *L. periclyme-* — *num L.* אין וועלדער VI—VIII.

3. די פרוכטקנ. פון די האָריקע בלם. אין די פרוכט פרייע אָדער צענויפגעוואַקסן נאָר ביים באַזיס — 4.

— די פרוכטקנ. און פרוכט אינגאנצן צענויפגעוואַקסן צווישן זיך. בלם.

גרינבלעך-ווייסע, פרוכט בלוילעך-שוואַרצע בלאַנקיטנער צ. *L. co-* *erulea L.* אין פייכטע, טאָרף-וועלדער און קוסטעס. VI—V.

4. די יונגע צווייגן, בלעטער און קר. האָריקע; בלם. געלבלעך-ווייסע; פרוכט טונקל-רויטע — האָריקער צ. *L. xylostium L.* אין וועלדער און צווישן קוסטעס.

— אַלע טיילן הוילע; בלם. ראָזע אָדער ווייסע; פרוכט געלבלעך-רויטע — טאַטערשער צ. *L. tatarica L.* ווערט קולטיווירט.

משפּחה באַרבאַריסנדיקע *Berberideae*.

באַרבאַריס *Berberis*.

אַ קוסט מיט 3 געטיילטע שיפן אויף די צווייגן; בלט. לענגלעך-פאַר-

קערט-איפאָרמיקע, מיט קורצע שטילכלעך, ביי די ראַנדן קליינגע-
צייננדלטע; בלמ. אין אַראָפהענגענדיקע הענגלעך; פּרוכט רויטע — גע-
ווינטלעכער ב. *B. vulgaris* L.

האַלונדער *Sambucus*.

דער געבליס אַ פלאַך שילדל מיט 5 הויפט-צווייגלעך, נאָכן בליען אַראָפּ-
הענגענדיקער; בלמ. געבלעך-וויסע, שמעקעדיקע, אייניקע אויף בלמ.-
פּיסלעך, די ראַנדיקע זיציקע; פּרוכט שוואַרץ-פּיאָלעטע; דאָס האַרץ ביי
די צווייגן וויסע. — שוואַרצער ה. *S. nigra* L. ווערט קולטיווירט.
אין ווילדן צושטאַנד זעלטן. VI—V.

דער געבליס אַן איפאָרמיק בעדיכט געזימל מיט האַריקע צווייגלעך
בלמ. אַלע אויף בלמ.-פּיסלעך; פּרוכט רויטע; דאָס האַרץ פון די צווייגן
ברוינלעך. — רויטער ה. *S. racemosa* L. ווערט קולטיווירט, אין
ווילדן צושטאַנד אַ סך אָפטער. VI—V.

די לאטיינישע נאמענקלאטור לויטן אלף-בית. (*)

	זייט
Abies — — — —	9
Acer — — — —	2—32
Aesculus — — — —	32
Alnus — — — —	2—18
Amorpha — — — —	31
Aruncus — — — —	22
<i>Berberideae</i> — —	5—37
Berberis — — — —	37
Betula — — — —	17
<i>Betulaceae</i> — —	2, 7—17
<i>Caprifoliaceae</i> — —	6—36
Caragana — — — —	31
Carpinus — — — —	17
<i>Celastraceae</i> — —	5—31
<i>Coniferae</i> — —	1—8
<i>Cornaceae</i> — —	5—35
Cornus — — — —	35
Corylus — — — —	2—17
Cotoneaster — —	24
Crataegus — — — —	25
Cytisus — — — —	31
Daphne — — — —	3—34
<i>Elaeagnaceae</i> — —	4—34
Elaeagnus — — — —	34
Erica — — — —	35
<i>Ericaceae</i> — —	5, 6—35
Evonymus — — — —	31
<i>Fagaceae</i> — —	2, 7—18
Fagus — — — —	18
Fraxinus — — — —	2, 6—36
Genista — — — —	20
Hippophae — — — —	35
Juniperus — — — —	9
Larix — — — —	8
Ligustrum — — — —	6—36
Lonicera — — — —	36

	זייט
Oleaceae — — — —	2, 3, 6—36
Oxycoccus — — — —	35
<i>Papilionaceae</i> — —	4—30
Philadelphus — —	3—20
Picea — — — —	9
Pinus — — — —	9
Pirus — — — —	25
Populus — — — —	1—16
Potentilla — — — —	26
Prunus — — — —	2—28
Quercus — — — —	2—19
<i>Rhamnaceae</i> — —	5—33
Rhamnus — — — —	33
Ribes — — — —	6—20
Robinia — — — —	31
Rosa — — — —	27
<i>Rosaceae</i> — —	2, 3—23
Rubus — — — —	25
<i>Salicaceae</i> — —	1, 7—9
Salix — — — —	10
Sambucus — — — —	38
<i>Sapindaceae</i> — —	2, 4—32
<i>Saxifragaceae</i> — —	3, 6—20
Spiraea — — — —	23
Staphylea — — — —	32
Symphoricarpus — —	36
Syringa — — — —	5—36
Taxus — — — —	8
Thuja — — — —	8
<i>Thymeleaceae</i> — —	3, 4—34
Tilia — — — —	33
<i>Tiliaceae</i> — —	3—33
Ulmaceae — — — —	2—19
Ulmus — — — —	19
Vaccinium — — — —	35
Viburnum — — — —	37
Vitis — — — —	1—33

(*) די נעמען פון די משפחות ווערן באצייכנט מיט קורסטיוו.

די יידישע נעמען פון די געוויקסן לויטן אלף=בית. *

זייט	זייט	זייט
23 — — — — ספירעע	16 — — — — הימלבוים	20—6 — — — — אגרעס
25 — — — — עפלבוים	20—6 — — — — וויינפערלעך	19 — — — — אולמע
36 — — — — עשעבוים	33—1 — — — — וויינטרויפן (ווילדע)	19—2 — — — — אולמענדיקע
33 — — — — פוילבוים	30—2 — — — — זומערפייגלדיקע	26 — — — — אָזשענעס
35—5 — — — — פוילביימענדיקע	36 — — — — זומפן=יאגדעס	36—6, 5, 2 — — — — איילבערטנדיקע
9 — — — — פיקטע	35 — — — — זילבערקוסט	18—2 — — — — אַלכע
32 — — — — פיימפערנוס	35 — — — — זשאַראַכלינעס	31 — — — — אַמאַרפע
24 — — — — פייערקוסט	20—3 — — — — זשאַסמין	16—1 — — — — אַספע
31 — — — — פייפעלעך	35 — — — — זשוראָווינעס	31 — — — — אַקאַציע
26 — — — — פינגערפלאַט	16—1 — — — — טאַפּאַל	37 — — — — באַראַריס
29 — — — — פלוימענבוים	8 — — — — טאַקסוס	37—5 — — — — באַראַריסנדיקע
32 — — — — פערד=קאַשטאַן	32 — — — — טויטע קאַפּ	36 — — — — בויעכעס
22 — — — — ציגנבאָרד	9 — — — — טענענבוים	18 — — — — בוק
37 — — — — ציגנבלאַט	28 — — — — טרויבנקאַרשנבוים	18—7 — — — — בוקענע
36—6 — — — — ציגנבלעטערדיקע	34—3 — — — — יאַגדעדיקע	36—5 — — — — בעז
38 — — — — קאַלינע	34—3 — — — — יאַגדעלע	17 — — — — בעראָזע
31 — — — — קאַנישינע=קוסט	20—3 — — — — יאַסמין	17—7, 2 — — — — בעראָנדיקע
29—2 — — — — קאַרשנבוים	8 — — — — לאַריקס	25 — — — — בערענעבוים
36—6, 2 — — — — קלאַרבוים	36—6 — — — — ליגוסטער	35—6 — — — — ברוסניצעס
32—2 — — — — קליאַן	33 — — — — לינדנבוים	34 — — — — גן=עדן=בוים
32—4, 2 — — — — קליאַנענדיקע	33—3 — — — — לינדנדיקע	גן=עדן=ביימענדיקע
25 — — — — ראַפּינע	36—5 — — — — מאַי	34—4 — — — — געניסטע
21—3, 2 — — — — ראָונבלומיקע	25 — — — — מאַלינעס	30 — — — — דאַרן
27 — — — — ראָזע	9 — — — — נאָדלבוים	25 — — — — דעמב
36 — — — — שוואַרצע יאַגדעס	8—1 — — — — נאָדלביימער	19—2 — — — — דרייפלאַט=קוסט
שטיינברעכערדיקע	9 — — — — נאָדל=יאַגדע	31 — — — — האָלונדער
20—6, 3 — — — — שליפּל	17—2 — — — — נוסבוים	38 — — — — האַרטפערנעט
38 — — — — שניי=יאַגדעס	32—2 — — — — נעזער=בוים	35 — — — — האַרטפערנעט
37 — — — — שנייקויל	9 — — — — סאַסנע	35—5 — — — — האַרטפערנעטנדיקע
31 — — — — שפינדלבוים	35—6, 5 — — — — סטעפּנדיקע	10—1 — — — — הושענאבוים
שפינדלביימענדיקע	35 — — — — סטעפּנהאַר	הושענאביימענדיקע
31—5 — — — —		9—7, 1 — — — —

(*) די נעמען פון די משפחות ווערן באצייכנט מיט א פעטערן שריפט.

יידיש, רוסיש, פוילישע נאמענקלאטור.

Agresr	Крыжовник	אָגרעס
Wiąz	Вяз	אולמע
Wiązowate	Вязовые	אולמענדיקע
Jieżyny	Ежевика	אָזשענעס
Oliwkowate	Маслинные	אילבערטנדיקע
Olsza	Ольха	אָלכע
	Аморфа	אַמאָרפּע
Osiczyna	Осина	אָספּע
Akacja	Акация	אַקאַצי
Berberys	Барбарис	באַרבאַריס
Berberysowate	Барбарисовые	באַרבאַריסנדיקע
Bagnówka	Голубика	בויעכעס
Buk	Бук	בוק
Bukowate	Буковые	בוקענע
Bez	Сирень	בעז
Brzoza	Берёза	בעראָזע
Brzozowate	Березовые	בעראָזנדיקע
Grusza	Груша	בערנעבויס
Brusznica	Брусника	ברוסניצעס
Oliwnik	Лох	גן-עדן-בויס
Oliwnikowate	Лоховые	גן-עדן-ביימענדיקע
Janowiec	Дрок	געניסטע
Głóżyна	Боярышник	דאָרן
Dąb	Дуб	דעמב
Szczodrzewica	Ракитник	דרייבלאַט-קוסט
Bez	Бузина	האַלונדער
Dereń	Кизиль	האַרטפּרענט
Dereniowate	Церенные	האַרטפּרענטנדיקע
Wierzba	Ива	הושענאבויס
Wierzbowate	Ивовые	הושענאביימענדיקע
Topola	Тороль	הימלבוים
Porzeszka	Красная смородина	וויינפערלעך
Winorośl	Дикий виноград	וויינטרויבן (ווילדע)
Motylikowate	Мотыльковые	זומערפייגלדיקע

